



# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

## आँकटोबर महिन्यातील कामांचा तपशील

### बागायती कापूस

- \* मोठ्या प्रमाणात गुलाबी बोंडअलीचे पतंग अडकविण्यासाठी प्रति हेक्टरी १० ते १२ कामगंध सापले लावावेत.
- \* गुलाबी बोंडअलीग्रस्त डोमकळ्या तोडून आतील अलीसह नष्ट कराव्यात.
- \* पिकातील २० ते ३० टक्के बोंडे फुटल्यानंतर पहिली वेचणी करून घ्यावी. त्यानंतर १५ ते २० दिवसांच्या अंतराने अनुक्रमे दुसरी व तिसरी वेचणी करावी.
- \* कापूस वेचणी आटोपल्यानंतर सर्व पन्हाट्या उपटून शेताबाहेर न्याव्यात व त्याचा कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी वापर करावा. जेणेकरून किंडीच्या अवस्था नष्ट होतील.

### ऊस

- \* आडसाली उसाच्या लागणीस को.८६०३२ या जातीसाठी शिफारशीत (५००:२००:२०० किलो नत्र, स्फुरद व पालाश प्रति हेक्टरी) खतमात्रेच्या १० टक्के नत्र ५० किलो प्रति हेक्टरी खताची तिसरी मात्रा (१२ ते १६ आठवडे वयाच्या उसासाठी) देण्यासाठी युरिया ११० किलो प्रति हेक्टरी वापरावा व इतर जातीच्या उसाकरीता प्रति हेक्टरी ४० किलो नत्र खतांचा तिसरा हस्ता (८७ किलो युरिया) लागणीनंतर १२ ते १६ आठवडयांनी घ्यावा. नत्र खताची मात्रा देण्यासाठी निमकोटेड युरियाचा वापर करावा.

- \* आडसाली उसाच्या लागणीस ६० दिवसांनी प्रतिहेक्टरी ५ लिटर मल्टीमॉन्युट्रीयंट (नत्र ८%, स्फुरद ८% व पालाश ८%)व मल्टीमायक्रोन्युट्रीयंट (ग्रेड-२) या द्रवरूप खतांची प्रत्येकी ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी उसाच्या लागणीस १० दिवस झाले असल्यास प्रतिहेक्टरी ७.५ लिटर मल्टीमॉन्युट्रीयंट व मल्टीमायक्रोन्युट्रीयंटची प्रत्येकी ७५० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
- \* आडसाली उसाला असेटोबॅक्टर जिवाणू संवर्धकाची बिजप्रक्रिया लागणीचे वेळी केलेली नसल्यास ६० दिवसांनी १ लिटर द्रवरूप असेटोबॅक्टर जिवाणू संवर्धकाची २०० लिटर पाण्यात मिसळून हेक्टरी फवारणी करावी.
- \* पूर्वहंगामी उसाच्या लागवडीसाठी पूर्वतयारी करा, पूर्वहंगामी उसाची लागण १५ आँकटोबर ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत पूर्ण करा.
- \* लागणीसाठी को.८६०३२, को.एम. ०२६५, फुले १०००१, को.एम.१२०८५ (फुले ९०५७), व्ही.एस.आय.१२१२१ आणि व्ही.एस.आय. ४३४ या जारीची निवड करा.

- \* लागणीच्या वेळी प्रति हेक्टरी ४० किलो नत्र (८७ किलो युरिया) को.८६०३२ जातीसाठी व इतर सर्व जारीसाठी ३४ किलो नत्र (७४ किलो युरिया) तसेच ८५ किलो स्फुरद (५३१ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट) आणि ८५ किलो पालाश (१४२ किलो स्फ्युरेट आॉफ पोटेश) ही रासायनिक खते से सीमध्ये घ्यावीत.
- \* लागणीपूर्वी बेण्यास ३०० मिली. मॅल्टिथिओॅन अथवा २६५ मिली डायमेथोॅट व १०० ग्रॅम बावीस्टीन १०० लिटर पाण्यात मिसळून तयार केलेल्या द्रावणात बेणे १० मिनीटे बुडवू बेणे प्रक्रिया करावी. या बिजप्रक्रियेनंतर प्रति हेक्टरी १० किलो असेटोबॅक्टर अथवा १ लिटर द्रवरूप असेटोबॅक्टर व स्फुरद विरघळविणारे जीवाणू १.२५ किलो १०० लिटर पाण्यात मिसळून तयार केलेल्या द्रावणात कांड्या ३० मिनीटे बुडवूव्यात.
- \* पाणी बचतीच्या दृष्टीने मध्यम जमिनीसाठी ७५-१५० सें.मी. पट्टा पद्धतीचा वापर करावा यासाठी ७५ सें.मी. अंतराच्या जोड ओळीनंतर एक ओळ रिकामी सोडावी सलग पद्धतीने लागवडीसाठी हलक्या जमिनीत ९० सें.मी. मध्यम जमिनीत १०० सें.मी. तर भारी जमिनीम

ध्ये १२० सें.मी. दोन सन्यातील अंतर ठेवावे. पाण्याच्या अधिक बचतीसाठी ठिक सिंचनाचा वापर करावा.

- \* लागणीनंतर वापसा येताच हेक्टरी ५ किलो अँट्राटाप किंवा मेरीब्यूझीन १.५ किलो प्रति १००० लिटर पाण्यात मिसळून जमिनीवर फवारावे. जमीन तुडवली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- \* पूर्वहंगामी उसात आंतरपिक म्हणून बटाटा, पानकोबी, फुलकोबी, वाटाणा, कांदा व लसून, यासारख्या भाजीपाला पिकांचा समावेश करावा.
- \* लोकरी मावाग्रस्त उसावर मित्रकाटक असल्यास रासायनिक कीटकानाशकांचा वापर करू नये. लोकरी माव्यासाठी डिफा अँफिडीब्हरा, मायक्रोमस यासारख्या मित्र किटकांचे संवर्धन करावे. तसेच उसासाठी शिफारशीत रासायनिक खतांचा संतुलीत वापर करावा व ऊस पिकास जास्त पाणी देवू नये.

### हरभरा व्यवस्थापन

- \* २० आँकटोबर ते १० नोव्हेंबर पर्यंत बागायती हरभरा बीजप्रक्रिया करून पेरावा.
- \* पेरणीनंतर लगेच पुरेसा ओलावा असताना उगवणीपूर्व तणनाशक पेंडिमेथॉलीन फवारावे.
- \* किडिनियंत्रणासाठी एकात्मिक किड नियंत्रण पध्दतीचा अवलंब करावा. यामध्ये सापळा पीक, कामगंध सापले, पक्षी थांबे याचा अवलंब करावा.

### तूर

- \* पिकाच्या शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत किडी पासून संरक्षणासाठी हेलिकोकिल (५०० मिली / ५०० लि. पाणी ) या जैविक किटकनाशकाची दुसरी फवारणी करावी व आवश्यकता असेल तर तिसरी फवारणी १८.५ % एस सी क्लोरअन्टीनिलोप्रोल १५० मिली अथवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५०% एस. जी. २०० ग्रॅम अथवा फल्युबेंडामाईड ४५ % एस. सी. १५० मिली/ ५०० लि. पाणी या किटकनाशकाची करावी.
- \* शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत पाऊस नसल्यास पिकास संरक्षित पाणी द्यावे किंवा २ टक्के युरियाची किंवा २ टक्के पोटेंशिअम नाईट्रिटची फवारणी करावी.

### नाचणी पीक

- \* नाचणी पीक पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. पावसामध्ये खंड पडल्यास उपलब्धतेनुसार संरक्षित पाणी घ्यावे.
- \* भेसळ काढणे.

### रब्बी ज्वारी

- \* पहिला पंधरवडा – पेरणीनंतर १५ दिवसांनी विरळणी करून एक ठिकाणी एक रोप ठेवावे व पेरणीनंतर ३ आठवड्यांने फटीच्या कोळप्याने पहिली कोळपणी करावी.
- \* दुसरा पंधरवडा – खोडकिडा नियंत्रण – खोडकिडा प्रादुर्भाव दिसल्यास क्युनॉलफॉस २५ ईसी ७५० मिली प्रवाही ५०० लीटर पाणी प्रती हेक्टरी फवारणी करावी. आवश्यकतेनुसार पहिली खुरणी करावी. पेरणीनंतर ५ आठवड्यांने पासेच्या कोळप्याने दुसरी कोळपणी करावी आणि गरज असल्यास पहिले संरक्षित पाणी घ्यावे.

### गहू

- \* गव्हासाठी भारी व खोल जमीन निवडून पूर्व मशागत करणे.
- \* बागायती पेरणीसाठी फुले समाधान, तपोवन, त्र्यंबक, गोदावरी या जातीमधून हेक्टरसाठी १०० किलो बियागे घेणे.
- \* जिरायती पेरणीसाठी पंचवटी किंवा नेत्रावती या वाणाचे हेक्टरी १२० किलो बियागे घेणे.

### भात

- \* पाणी व्यवस्थापन काढणीपूर्वी १० दिवस अगोदर पाण्याचा निचरा करावा.
- \* कापणी पीक नियंत्रणपन काढणीपूर्वी १० दिवसांनी ३० दिवसांनी १००% दाणे पक्व झाल्यावर भाताची कापणी करावी. वैभव विळ्याचा वापर यासाठी करावा. यामुळे खोडकिडीचे नियंत्रण होते.

### फळबाग व्यवस्थापन

- \* डाळिंब – पक्व फळांची काढणी करणे व खतांची हलकी मात्रा देऊन बाग ताणावर सोडावी.
- \* सिताफळ – गरज असल्यास पाणी व्यवस्थापन करून पिकलेली फळे काढावीत.
- \* बोर – गरज असल्यास पाणी व रोग किंडीचे नियंत्रण करावे.
- \* आवळा – पक्व झालेली फळे काढण्यात सुरवात करावी.
- \* अंजीर – खतांचे नियोजन करणे व मिठा बहार धरणेसाठी पाण्याचे नियोजन करावे.
- \* जांभूळ – बाग ताणावर सोडावी.
- \* कागदी लिंबू – हस्त बहाराचे नियोजनासाठी १ टक्का पोटेंशियम नायट्रोट्रीटची फवारणी करावी.
- \* मोसंबी : आंब बहाराच्या फळांची काढणी करावी.

व माती आड करावे.

- \* हुमणी नियंत्रणासाठी मेटान्हाझीयम या जैविक किडनाशकाचा वापर करावा तसेच भुंगे आर्किष्ट करण्यासाठी एंड आंबवण सापळयाचा वापर करावा.
- \* काढणी आणि उत्पादन
- \* आले पीक ७५ टक्के परिपक झालेनंतर काढणी केली तरी मार्केटला विळीसाठी चालते.
- \* हिरवे आले म्हणून वापरावयाचे असल्यास पिकाची काढणी ६ महिन्यांनी करवी.

### पशुसंवर्धन

- \* या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात आंतरकूमी व बाह्य परोपजीवींचा नायनाट करण्यासाठी बहुप्रभावी जंतनाशक औषध पशुवैद्यकाच्या सहाय्याने द्यावे.
- \* उर्जा व प्रथितेयुक्त पशु आहाराचा समावेश करून पशु आहार वाढवावा.
- \* थंडीची सुरुवात होवून श्वसनाचे आजार संभावण्याची शक्यता असते त्यामुळे विशेषत: लहान वासरांची काळजी घ्यावी.

### अवजारे

ट्रॅक्टरचलित फुले हायड्रो-मेक्निकली नियंत्रित फळबागेतील दोन झाडांच्यामधील तण काढणी यंत्र



- \* रोटरी युनिट दोन झाडांच्या मध्ये व बाहेर हायड्रो-मेक्निक यंत्रेनेद्वारे सहजपणे कार्य करते.
- \* फ्रेमच्या योग्य मांडणीमुळे ट्रॅक्टर चालकास यंत्र व्यवस्थित दिसते.
- \* दोन झाडांच्या मध्यल्या जागेतील किंवा दोन झाडांच्या ओळीमधील तण काढण्याची उपयुक्त.

&lt;div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px; border-radius: