



हवामान आधारीत कृषि सल्ला

ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

५८) हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. १७/०९/२०२१

जिल्हा : धुळे

मागील आठवड्यातील हवामान (१०/०९/२०२१ ते १६/०९/२०२१)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज (१८/०९/२०२१ ते २२/०९/२०२१)				
१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	दिनांक	१८	१९	२०	२१	२२
०.०	९.०	१६.०	०.०	०.०			पाऊस (मिमी)	८	३	६	१०	२०
३१.०	३३.०	३२.०	३०.०	३२.०			कमाल तापमान (अं.से.)	३१	३१	३०	३१	२९
२०.०	२०.०	१९.७	२१.२	२१.२			किमान तापमान (अं.से.)	२३	२४	२४	२४	२३
२.०	२.०	२.०	२.०	२.०			ढग स्थिती (आकाश)	७	४	६	८	८
८८.०	९२.०	८८.०	९३.०	९०.०			सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८७	९०	८६	८८	९३
६३.०	७०.०	६३.०	६४.०	०.०			दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६२	६१	६२	६६	७३
१.२	३.७	२.९	१.४	१.६			वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१२	१३	१४	१५	१३

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		पुढील पाच दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. पुढील पाच दिवस काही ठिकाणी अतिशय हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		१) शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून दिल्यास काम पण योग्य होईल आणि योग्य सामाजिक अंतरही ठेवले जाईल . शेती यंत्रे निर्जंतुकीकरण करावीत . तोंडाला मास्क अथवा कापड गुडाळावे. २) पिकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी. ३) हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला व हवामानचा पूर्वानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा..
संदेश		कपाशी: बोंड अळीच्या नियंत्रणाकरिता लॅम्बडा-सायहालोथ्रीन ५% प्रवाही ८ मिली किंवा स्पिनोसॅड ४५ एस सी ३.५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
*कपाशी	बोंड धरणे	बोंड अळीच्या नियंत्रणाकरिता लॅम्बडा-सायहालोथ्रीन ५% प्रवाही ८ मिली किंवा स्पिनोसॅड ४५ एस सी ३.५ मिली किंवा प्रोफेनोफोस ५० ईसी ३० मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब १५.८ ईसी १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
*सोयाबीन	शेंगा भरण्याची अवस्था	चक्री भुंग्याच्या नियंत्रणाकरिता थायक्लोप्रिड २९.७ एस सी १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
*मका	दाणे चिकात असताना	अमेरिकन लष्करी अळीच्या नियंत्रणाकरिता थायमेथोक्झाम १२.६% + लॅम्बडा सायहेलोथ्रीन ९.५% झेड सी या मिश्र कीटकनाशकाची ०.५ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. किंवा क्लोरांटानिलीप्रोल १८.५% एस सी या कीटकनाशकाची ०.४ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. फवारणी करिताना औषध पानावर अथवा इतरत्र न फवारता पोंग्यामध्येच पडेल याची दक्षता घ्यावी जेणे करून औषधाचा परिणाम योग्य दिसेल.
*तूर	फांद्या फुटण्याची अवस्था	तूर पिकावर खोड माशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास ५ टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी करावी. तूर पिकात वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येताच अशी रोगग्रस्त झाडे उपटून नष्ट करावीत. या रोगाचा प्रसार कोळी या कितकामार्फत होतो. कोळी नियंत्रणासाठी रासायनिक औषधाची फवारणी करावी.
*भुईमुग		वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकाची काढणी करून घ्यावी.
*बाजरी		वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकाची काढणी करून घ्यावी.
हरभरा		कोरडवाहू हरभरा पिक पेरणीसाठी जमिनीची मशागत करावी. खरिप हंगामातील पिक काढणीनंतर काडीकचरा व धसकटे गोळा करून घ्यावीत. कोरडवाहू हरभरा पिकाची पेरणी २० सप्टेंबरपासून पुढे करावी.
कांदा		कांदा या पिकावर फुलकिडे व करपा आढळून आल्यास लॅम्बडासायहेलोथ्रीन ५ ईसी. ६ मिली. + टेब्युकोनेझोल १० मिली + स्टिकर १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारणी करावी.
वांगी		वांगी पिकावर शेंडे व फळ पोखरणारी अळीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी एकात्मिक कीड नियंत्रण करावे. किडग्रस्त शेंडे दर आठवड्यातून खुडून टाकावे आणि नष्ट करावेत. तोडणीनंतर किडग्रस्त फळे गोळा करून जमिनीत गाडून टाकावीत. तसेच अळीचे नियंत्रणासाठी सायपरमेथ्रीन १०% प्रवाही १० मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब १४.५ ईसी. १० मिली



हवामान आधारीत कृषि सल्ला ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

		किंवा स्पायनोसॅड ४५ ईसी ५ मिली किंवा क्लोरेंट्नीलीप्रोल १८.५ एससी ३ मिली प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारावे. अधून-मधून ५ टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.
टोमॅटो		रस शोषणार्या किडींच्या नियंत्रणाकरिता इमिडाक्लोप्रीड ५ मिली किंवा थायोमोक्झासम ४ ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारणी करावी. फळ पोखरणारी अळीच्या नियंत्रणाकरिता सायपरमेथ्रीन १० ईसी १० मिली + ट्रायझोफॉस ३५% ईसी [संयुक्त किटकनाशक] २० मिली + टेब्यूकोनेझोल १० मिली प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारणी करावी. अधून-मधून ५% निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.

*वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकांकरिता

स्त्रोत :

१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

२) मागील हवामान :

ठिकाण : मफुकृवि , राहुरी.

दि. : १७/०९/२०२१

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरीतथा
प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.