



हवामान आधारीत कृषि सल्ला

ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल: rahuri.amfu@gmail.com

१०४) हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. २६/०२/२०२१

जिल्हा : धुळे

मागील आठवड्यातील हवामान (१९/०२/२०२१ ते २५/०२/२०२१)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानअंदाज (२७/०२/२०२१ ते ०३/०३/२०२१)				
१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	दिनांक	२७	२८	०१	०२	०३
							पाऊस (मिमी)	०	०	०	०	०
							कमाल तापमान (अं.से.)	३५	३४	३४	३५	३४
							किमान तापमान (अं.से.)	१८	१९	२०	१९	१९
							ढगस्थिती (आकाश)	०	०	०	०	०
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३३	३६	३१	२८	१४
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	१५	१६	१३	१२	९
							वाऱ्याचा वेग (किमी/ तास)	१०	१०	८	९	६

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहील.
सामान्य सल्ला		हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला व हवामानचा पूर्वानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा. शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून दिल्यास काम पण योग्य होईल आणि योग्य सामाजिक अंतरही ठेवले जाईल . शेती यंत्रे निर्जंतुकीकरण करावीत . तोंडाला मास्क अथवा कापड गुडाळावे. पिकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी.
संदेश		कांदा: फुलकिडे, करपा नि यंत्रणासाठी डायमेटोएट १५ मिली + कार्बेन्डॅझीम १० ग्रॅम + १० मिली स्टिकर प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भुईमुग	रोप अवस्था	जमीनीत ओलावा टिकविण्यासाठी , हवा खेळती राहण्यासाठी तसेच गवताचे व तणांचे नियंत्रण करण्यासाठी हात कोळप्याने कोळपणी करून घ्यावी.
हरभरा	काढणी	हरभरा पीक सर्वसाधारणपणे ११० ते १२० दिवसांमध्ये काढणीसाठी परिपक्व होते. हरभरा पिकाची काढणी घाट्यामध्ये १४ ते १६ % ओलावा असताना करावी त्यामुळे नुकसान कमी होते.
हरभरा	घाटे भरण्याची अवस्था	पिवळी पडलेली रोगग्रस्त झालेली किंवा वाळलेली झाडे उपटून नष्ट करावी. ज्या ठिकाणी हरभऱ्यात मोठ्या अवस्थेतील घाटे अळी आढळून आल्यास क्लोरंट्रानिलीप्रोल १८ .५० एस सी @ २ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे (एकरी २०० लिटर पाणी).
मका	दाणे भरताना	खोडकिडीच्या नियंत्रणासाठी उगावणीनंतर ८-१० दिवसांनी १५ मिली डायमेटोएट ३० % प्रवाही प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
चवळी (चारा)		मावाच्या नियंत्रणासाठी निंबोळी अर्क ५ टक्के फवारावे. मावा जास्त प्रमाणात असेल तर १० मिली डायमेटोएट ३० टक्के प्रवाही प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे. औषध फवारल्यानंतर ७ दिवस जनावरांना हिरवा चारा घालू नये.
रब्बी ज्वारी	काढणी	पीक परिपक्व झाले असल्यास काढणी करून घ्यावी काढणी झालेल्या पिकाची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
कांदा		फुलकिडे व करपा या कीड व रोगाच्या नियंत्रणासाठी डायमेटोएट १५ मिली. किंवा लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ६ मिली अधिक कार्बेन्डॅझीम १० ग्रॅम किंवा टेब्युकोनॅझोल १० मिली+स्टिकर १० मिली प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
गहू	दाणे भरताना	मावा व तुडतुडे या किडींचा प्रादुर्भाव अर्थिक नुकसान पातळीस दिसून येताच १ ग्रॅम थायामिथाक्झाम २५ डब्ल्यू.जी. प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
मिरची		मिरचीवरील रस शोषणा-या फुलकिडे, पानावरील ठिपके इत्यादी रोग आढळून आल्यास , त्यासाठी फिप्रोनील १५ मिली किंवा फेनपायराॅक्झीमेट ५ ईसी. १ ० मिली. किंवा फेनाक्झाक्झिन १० ईसी. २० मिली. अधिक मॅन्कोझेब २५ ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्झिक्झोराईड २५ ग्रॅम किंवा टेब्युकोनॅझोल १० मिली. प्रति १० लीटर पाण्यात मिसळून साध्या हात पंपाने फवारणी करावी. दहा दिवसांच्या अंतराने या फवारण्या आलटून-पालटून कराव्यात.



हवामान आधारीत कृषि सल्ला
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी,
कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल: rahuri.amfu@gmail.com

स्त्रोत :

- १) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.
- २) मागील हवामान :

ठिकाण : मफुकृवि , राहुरी.

दि. : २६/०२/२०२१

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा
प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.