



# अग्रोमेट अडवायझरी बुलेटीन

ग्रामीण कृषी मौसम सेवा, ए.एम.एफ.यु., इगतपुरी

विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, इगतपुरी



दूरध्वनी: ०२५५३ २४४०१३

ईमेल - adr.igatpuri20@gmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि.१३.०३.२०२०

जिल्हा: नाशिक

| मागील आठवड्यातील हवामान<br>(०७.०३.२०२० ते १३.०३.२०२०) |        |        |        |        |       |         | हवामान घटक                  | पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज<br>(१४.०३.२०२० ते १८.०३.२०२०) |        |         |         |       |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|
| ०७/०३                                                 | ०८/०३  | ०९/०३  | १०/०३  | ११/०३  | १२/०३ | १३/०३   | दिनांक                      | १४/०३                                                            | १५/०३  | १६/०३   | १७/०३   | १८/०३ |
| ०.०                                                   | ०.०    | ०.०    | ०.०    | ०.०    | ०.०   | ०.०     | पाऊस (मिमी)                 | ०.०                                                              | ०.०    | ०.०     | ०.०     | ०.०   |
| २८.५                                                  | २९.५   | ३१.०   | ३१.०   | ३०.५   | २८.४  | २७.५    | कमाल तापमान (अं.से.)        | २९                                                               | ३०     | ३१      | ३२      | ३२    |
| १३.५                                                  | ११.८   | १४.०   | १४.०   | १४.२   | १२.०  | १३.२    | किमान तापमान (अं.से.)       | १३                                                               | १४     | १५      | १५      | १५    |
| निरक्ष                                                | निरक्ष | निरक्ष | निरक्ष | निरक्ष | ढगाळ  | अ: ढगाळ | ढग स्थिती (आकाश)            | निरक्ष                                                           | निरक्ष | अ: ढगाळ | अ: ढगाळ | ढगाळ  |
| ८८                                                    | ९२     | ८४     | ८४     | ८५     | ९०    | ८६      | सकाळची सापेक्षआर्द्रता(%)   | ७९                                                               | ७६     | ७४      | ७२      | ७२    |
| ४२                                                    | ४१     | ३१     | ३१     | ३३     | ५३    | ३०      | दुपारची सापेक्ष आर्द्रता(%) | ४१                                                               | ३८     | ३६      | ३६      | ३६    |
| ६.२                                                   | ३.५    | ३.३    | ३.३    | ७.४    | ४.५   | ४.७     | वा-याचा वेग (किमी/ तास)     | ८                                                                | ११     | ८       | ७       | ५     |

## हवामान अंदाजावर कृषी सल्ला सेवा

| पिक                  | अवस्था        | कृषी विषयक सल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हवामान सारांश/ इशारा |               | पुढील पाच दिवसात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे.तसेच कमाल तापमान २९-३२ डिग्री सें. व किमान तापमान १३-१५ डिग्री सें. दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे तसेच वा-याचा वेग ५-११ कि.मी./तास या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सामान्य सल्ला        |               | १. शेतकऱ्यांना सल्ला देण्यात येतो कि पाण्याचा सुक्ष्म सिंचन पद्धतीचा उपयोग करून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करावा.<br>२. ठिबक व तुषार सिंचन संचामधील गाळणयंत्रणा साफ कराव्यात. तसेच तोट्यानमधून पाणी बरोबर पडत असल्याची खात्री करावी.<br>३. मातीचे नमुने तपासणीसाठी मृदचाचणी प्रयोग शाळेकडे पाठवावेत.<br>४. काढणी झालेल्या पिकांची मळणी करून सुरक्षीत ठिकाणी साठवणूक करावी.<br>५. उन्हाळी मुगाची पेरणी करावी.                                                                                                                                                                                                    |
| संदेश                |               | उन्हाळी भुईमुगावरील पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी एन रीलेयी@ ४० ग्राम किंवा एस.एल.एन.पी.व्ही.@ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गहू                  | कापणी व मळणी  | १. पिक तयार होताच वेळेवर कापणी करावी.<br>२. कापणीस उशीर झाल्यास एन आय-५४३९ व त्र्यंबक (एन आय ए डब्ल्यू-३०१) या गव्हाच्या वाणाचे दाणे शेतात झडू शकतात. म्हणून पिक पक्व होण्याच्या २-३ दिवस अगोदर कापणी करावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| भुईमुग               | वाढीची अवस्था | १. उन्हाळी भुईमुगावरील पाने गुंडाळणाऱ्या व पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एस.जी@ ४ ग्राम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.<br>२. उन्हाळी भुईमुगावरील पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी एन रीलेयी@ ४० ग्राम किंवा एस.एल.एन.पी.व्ही.@ १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे<br>३. पेरणीनंतर नांग्या आढळून आल्यास बी टोकून ते ताबडतोब भरावेत.<br>४. १० ते १२ दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ कोळपण्या कराव्यात व २ निंदण्या (खुरपण्या) द्याव्या.<br>५. पेरणीनंतर तणांच्या बंदोबस्तासाठी २०-२५ दिवसांनी परसूट किंवा टरगासुपर १५ मिली प्रति हे. प्रति १० लिटर पाण्यातून द्यावे. |

|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हरभरा      | काढणी व अवस्था | १. हरभरा पिक ओलसर असताना काढणी करू नये. घाटे कडक वाळल्यानंतर मगच हरभऱ्याची काढणी करून मळणी करावी.<br>२. हरभरा पिक काढणी व मळणीनंतर धान्यास ६-७ दिवस कडक उन द्यावे.<br>३. कीड लागू नये म्हणून हरभरा कोठीत साठवणूक करताना त्यामध्ये कडूलिंबाचा पाला (५ टक्के) घालावा.                                                                                                                                           |
| फळझाडे     |                | फळपिकांमध्ये पाण्याचे योग्य नियंत्रण करण्यासाठी शेतातील वेगवेगळ्या पिकांचे अवशेष (पालापाचोळा, गव्हाचा कोंडा, पाचट इ.) यांचे आच्छादन करावे.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| द्राक्ष    | फळ काढणी       | द्राक्ष बागेतील पिठ्या ढेकणाच्या नियंत्रणासाठी व्हर्टिसिलीअम लेक्कनी ५० ग्रॅम + ५० मिली दुध प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ऊस         |                | उसामध्ये हुमणीच्या नियंत्रणासाठी खोल नांगरट करावी तसेच हुमणीच्या नियंत्रणासाठी परोपजीवी बुरशीसाठी मेटॅरिझियम अनीसोप्लि हेक्टरी ५ किलो शेणखतातून द्यावे.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आंबा       |                | १. वाढते तापमान व कोरडे हवामान लक्षात घेऊन आंबा झाडाना प्रति झाड १५० ते २०० लीटर पाणी १५ दिवसांच्य अंतराने द्यावे. व फळगळ कमी करण्यासाठी २० पीपी एम (PPM) (१ ग्रॅम ५० लिटर पाण्यात) नॅफ्थॉलिक अॅसेटीक अॅसिड (NAA) संजीवकाचे द्रावण मोहोरावर फवारावे.<br>२. आंबा पिकावरील तुडतुडे व भुरी नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस एल@ ३ मिली + सल्फर ८० % डब्ल्यू पी@ २५ ग्रॅम १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करणे. |
| मिरची      |                | मिरचीवरील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी इमिडाक्लोप्रिड १७.८ % एस.एल. ५ मिली / १० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वांगी      |                | १. वांगीवरील तुडतुडे, मावा व पांढरीमाशी या किडींच्या नियंत्रणासाठी फॉस्फेमीडॉन ४० % एस.एल. १५ मिली किंवा फेनप्रोपॅथीन ३० % ई.सी. ५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून-पालटून फवारण्या कराव्यात. अधून-मधून ५ % निंबोळी अर्काची फवारणी करावी<br>२. वांगी पिकांवर कोळी आढळल्यास फेनप्रोपॅथीन ३० % ई.सी ५ मिली किंवा डायकोफॉल १८.५ ई.सी. २५ मिली १० लिटर पाण्यातून फवारावे.                                  |
| पशुसंवर्धन |                | सर्व निरोगी जनावरांना लाळ खुरकत रोगाची प्रतिबंधक लस वर्षातून दोन वेळा (सप्टेंबर-मार्च) टोचावी. तसेच लागण झालेल्या जनावरांना इतर जनावरांपासून बाजूला ठेवावे.                                                                                                                                                                                                                                                   |

स्त्रोत:

- १) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई  
२) मागील आठवड्यातील हवामान : ग्रा.कृ.मौ.सेवा, हवामान वेधशाळा, वि.कृ.सं.,केंद्र, इगतपुरी

ठिकाण : वि.कृ.सं.,केंद्र, इगतपुरी

दिनांक : १३.०३.२०२०

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्रा.कृ.मौ.सेवा, इगतपुरी तथा  
सहयोगी संशोधन संचालक, वि.कृ.सं.,केंद्र, इगतपुरी