



ऑग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, एएमएफयु,

कृषी हवामानशास्त्र विभाग



फोन : ०२०-२५५३८००९

कृषी महाविद्यालय, पुणे ४११ ००५

ई-मेल : amfupune@gmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. ०२/०६/२०२०

जिल्हा : पुणे

मागील आठवड्याचे हवामान :

मागील आठवड्याचे हवामान : पुणे परिसरात मागील आठवड्यात कमाल तापमान ३७.० ते ४०.० अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २१.० ते २५.२ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान होते. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ६१ ते ८८ टक्के तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता २६ ते ७५ टक्के होती. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी ५.६ ते १०.४ कि.मी. होता. मागील आठवड्यात २.९ मिमी एवढा पाऊस झाला.

हवामान अंदाज : या आठवड्यात पुणे जिल्ह्यात कमाल तापमान २८ ते ३६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ ते २६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ८२ टक्के तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ५५ टक्के दरम्यान राहील. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी १३ ते ३५ कि.मी. दरम्यान राहील. आकाश ढगाळ राहील. वाऱ्याची दिशा नैऋत्येकडून ईशान्येकडे राहील.

मागील आठवड्यातील हवामान (२६/०५/२०२० ते ०१/०६/२०२०)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (०२/०६/२०२० ते ०६/०६/२०२०)				
26	27	28	29	30	31	1	दिनांक	3	4	5	6	7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	पाऊस (मिमी)	78	120	12	9	6
40.0	37.4	37.5	37.0	37.5	37.9	37.4	कमाल तापमान (अं.से.)	33	28	33	35	36
25.2	23.8	23.8	23.9	24.4	24.9	21.0	किमान तापमान (अं.से.)	26	22	25	24	24
							ढग स्थिती (आकाश)	8	8	6	2	1
61	72	67	71	70	73	88	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	83	85	83	80	79
42	26	31	31	30	33	75	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	49	74	57	50	47
6.9	8.2	9.5	10.4	9.9	7.2	5.6	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	35	21	13	17	15
							वाऱ्याची दिशा (अंश)	145	244	244	246	251

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	पीक अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश/ इशारा		भारतीय हवामान खा -त्याच्या अंदाजानुसार अरबी समुद्रामध्ये निर्माण झालेल्या चक्री वादळामुळे जिल्ह्यात दिनांक ०२ व ०३ जून रोजी बहुतांश ठिकाणी, दि. ०४ जून रोजी अनेक ठिकाणी, दि. ०५ व ०६ जून २०२० रोजी काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ईशारा : दिनांक ०२ जून २०२० रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व सोसाट्याच्या वाऱ्यासह (वाऱ्याचा वेग ताशी ४० - ५० कि.मी.) जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दिनांक ०३ जून २०२० रोजी अनेक ठिकाणी जोरदार ते अति जोरदार तसेच तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असून दिनांक ०४ जून २०२० रोजी तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		- पाऊसाची शक्यता असल्याने काढलेली पिके पावसापासून संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्यरीत्या झाकून ठेवावीत. पाऊसापासून बचावासाठी उघड्यावरील धान्य सुरक्षित स्थळी हलवावे. - जनावरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत. - पक्व फळांची व फळभाजांची लवकरात लवकर काढणी करावी. - काढणी केलेल्या पिकांची व धान्याची सुरक्षित स्थळी साठवणूक करावी.

		- पावसाचा अंदाज बघून पिकावर किटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. - खरीप हंगामामध्ये पिक घेण्यासाठी विद्यापीठ विक्री केंद्र किंवा शासन मान्यता प्राप्त विक्री केंद्र यांकडून बियाणे खरेदी करावे.
आंबा	फळ पक्वता ते काढणी अवस्था	आंब्यावरील फळमाशीच्या नियंत्रणासाठी मिथिल युजेनॉल युक्त रक्षक सापळे बागेमध्ये एकरी ८-१० याप्रमाणे लावावेत. पक्व झालेल्या आंब्याची काढणी शक्यतो सकाळी दहापुर्वी किंवा दुपारी ४ नंतर करावी तसेच आंबा फळांची वाहतुक शक्यतो संध्याकाळी करावी. तयार झालेली आंब्याची फळे काढून सुरक्षित ठिकाणी पिकण्यासाठी ठेवावे.
भेंडी व टोमॅटो	फळधारणा	भेंडी व टोमॅटोवरील फळपोखरणा-या अळीच्या व्यवस्थापनासाठी किडलेली फळे मातीत पुरून टाकावीत तसेच डेल्टामेथ्रीन २.८ % ईसी ८ मिली किंवा क्विनॉलफॉस २५ % ईसी २० मिली किंवा लॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी ६ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भात	पूर्व तयारी	भात पिकासाठी रोपवाटीका तयार करण्याच्या दृष्टीने पुर्वतयारी करावी. १ हेक्टर क्षेत्र लागवडीसाठी १० गुंठे रोपवाटीका तयार करावी. पेरणीसाठी सुधारित/ संकरित वाणांचे बियाणे शासकीय यंत्रणेकडून/ कृषि विद्यापीठांच्या विक्री केंद्राकडून उपलब्ध करून ठेवावे. भात तूसाची राख उपलब्ध करून ठेवावी. गादीवाफे तयार करताना १ मी रुंदीचे, १५ सेमी उंचीचे व आवश्यकतेनुसार लांबीचे गादीवाफे तयार करून ठेवावे. वाफे तयार करताना २५० किलो शेणखत प्रति गुंठा मातीत मिसळावे.
केळी		झाडे पडू नयेत म्हणून व वजनाने मोठ्या असलेल्या घडास गर्जप्रमाणे बांबूच्या किंवा पॉलीप्रोपेलीनच्या पाट्यांच्या सहाय्याने झाडांना/ घडाना आधार/ टेकू द्यावा. केळीच्या बुंध्याजवळ वाढणारी पिल्ले नियमित कापावीत तसेच केळीवरील जुनी वाळलेली व रोगट पाने कापून बाग स्वच्छ ठेवावी.
लिंबू वर्गीय पिके		सिट्रस सायला या रस शोषणाच्या किडीच्या नियंत्रणासाठी १० मिली क्विनॉलफॉस २५% प्रवाही किंवा ५.५ मिली नोवालुरॉन १०% प्रवाही प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
जनावरांचे व्यवस्थापन		जनावरांना पोटातील जंताच्या नियंत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या सहाय्याने जंतनाशक पाजावे. जनावरांना रोग प्रतिबंधक उपाय म्हणून पशु वैद्यकाच्या सहाय्याने योग्य वेळी लसीकरण करून घ्यावे तसेच जनावरांना व पक्ष्यांना नेहमी पिण्यास स्वच्छ व थंड पाणी द्यावे.
*टिप : शेतकरीबंधूनी पिकावर किटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना स्वतःची योग्यता खबरदारी/ काळजी घ्यावी.		

स्त्रोत :

१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

२) मागील हवामान : भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशाळा , कृ.म.वि., पुणे

ठिकाण : कृ.म.वि., पुणे.

दि. : ०२.०६.२०२०

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, पुणे तथा
प्रमुख, कृषि हवामानशास्त्र विभाग, कृ.म.वि., पुणे