



अग्रोमेट अडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. ०७.०४.२०२०

जिल्हा : सांगली

हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (०८.०४.२०२० ते १२.०४.२०२०)				
दिनांक	०८	०९	१०	११	१२
पाऊस (मिमी)	३	०	०	०	०
कमाल तापमान (अं.से.)	३६	३६	३६	३६	३६
किमान तापमान (अं.से.)	२१	२१	२१	२१	२१
ढग स्थिती (आकाश)	२	०	०	१	०
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७०	५८	५६	५५	५४
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३१	२१	२६	२३	२४
वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	६	९	७	६	४
वाऱ्याची दिशा	पश्चिम	पूर्व.आग्नेय	आग्नेय	पूर्व.ईशान्य	आग्नेय

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश/ इशारा		भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणे यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार सांगली जिल्ह्यात दिनांक ८ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तापमान ३६.० अंश सेल्सिअस दरम्यान तर किमान तापमान २१.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील. वाऱ्याचा वेग ताशी ०४ ते ०९ कि.मी. राहील.
सामान्य सल्ला		- शेतकऱ्यांनी नोवेल कोरोना व्हायरस या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रसार व प्रादुर्भाव यापासून बचावासाठी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे तसेच स्वतःची काळजी घ्यावी. - उन्हाळ्याच्या सुरवातीला फळबागेभोवती सुबाभूळ, शेवरी, मलबेरी, सुरु तसेच गिलरीसीडीया यांसारखी झाडे लावावीत ती वारा प्रतिरोधक म्हणून काम करतात त्यामुळे बागेचे उष्ण वाऱ्यापासून संरक्षण होते व बागेतील बाष्पीभवनाचा वेग कमी होऊन जमिनीमध्ये ओलावा टिकून राहण्यास मदत होते. - तापमानामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे वाढणाऱ्या बाष्पीभवणामुळे उन्हाळी पिकांना आवश्यक तेवढे पाणी द्यावे.
संदेश		सांगली जिल्ह्यात दिनांक ८ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.कमाल व किमान तापमानामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मका	वाढीची	- मक्यावरील लष्करी आळी/ स्पोडोप्टेरा फ्रुजीपेरडा या आळीचा प्रादुर्भाव दिसताच प्रादुर्भाव ग्रस्त पिकावरील अंडीपुंज गोळा करून नष्ट करावेत. - पिकामध्ये एकरी ४ या प्रमाणात कामगंध सापळे लावावेत. - पिकामध्ये पक्षी थांबे लावावेत.
रब्बी ज्वारी	पक्वता	काढणी केलेल्या शेती मालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भुईमुग	शेंगा पोसण्याची	- उन्हाळी भुईमुगास जमिनीच्या मगदूमाप्रमाणे ८ ते १० दिवसांच्या अंतराने पाणी द्यावे. - भुईमुगावरील रस शोषणाऱ्या किडीसाठी मिथिल डिमेटॉन २५ ई.सी. १० मी.ली. प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. - टिक्का रोग नियंत्रणासाठी मॅकोझेब २.५ ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम १ ग्रॅम प्रतिलिटर पाण्यातून फवारावे.
ऊस	वाढीची	सुरु हंगामी लागवड केलेल्या ऊस पिकाच्या लागणीस ६ ते ८ आठवडे झाले असल्यास नत्र खताचा दुसरा हप्ता १०० किलो नत्र (२१७ किलो युरिया) प्रती हेक्टरी या प्रमाणात द्यावा.



अग्रोमेट अडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

टोमॅटो	वाढीची	➤ टोमॅटोवरील फळे पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी नोव्हॅलीरॉन १०% ई.सी. १५ मिली किंवा क्लोरॅनट्रॅनिलीप्रोल १८.५% एस.सी. ३ मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
काकडी, कारली	फळधारणा	➤ काकडी व कारली या वेलवर्गीय पिकांवर केवडा व भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास नियंत्रणासाठी अझोक्झीट्रोबिन १० मिली किंवा सायमॉझॉनील + मॅन्कोझेब २५ ग्रॅम अधिक चिकट द्रव १० मिली प्रती १० लिटर पाणी या प्रमाणात मिसळून फवारणी करावी.
नारळ	वाढीची	➤ उन्हाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असल्याने नवीन लागवड केलेल्या नारळ रोपांना शेडनेटच्या सहाय्याने सावली तयार करावी व व वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता असल्याने नारळ रोपांना काठीचा आधार द्यावा.
आंबा	फळधारणा	➤ बाष्पीभवनाचा वेग वाढलेला आहे त्यामुळे जमिनीतील ओलावा कमी होऊ नये म्हणून फळझाडांच्या खाली वाळलेली पाने, तूर काड्या, उसाचे वाळलेले पाचट इ. चे आच्छादन करावे.
काजू	पक्वता	➤ तयार झालेल्या काजू बियांची काढणी करावी. काढणी केलेल्या बिया उन्हामध्ये वाळवाव्यात आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवाव्यात.
जनावरे	वाढीची	➤ जनावरे सावलीमध्ये बांधावीत. जनावरांना शुद्ध, स्वच्छ आणि थंड पाणी पिण्यास द्यावे. ➤ पशुवैद्यकांच्या सल्ल्यानुसार शेळ्यांना स्ट्रॅगॉल (गोलकृमी) या जंताच्या निर्मुलानाठी एप्रिल महिन्यामध्ये फेनबेन्डाझोल हे जंतनाशक द्यावे. ➤ उन्हाळ्याच्या सुरवातीस एप्रिल महिन्यामध्ये मेंढ्यांना देवी या रोगाची प्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी. ➤ म्हशींमध्ये घर्मग्रंथी कमी असल्यामुळे घामातून त्यांच्या शरीरात उष्णतेचे उत्सर्जन होत नाही त्यामुळे म्हशींना पाण्यात डुबु द्यावे. गायीच्या अंगावर ओले कपडे किंवा गोणपाट भिजवून ते गाईच्या पाठीवर ठेवावे.

स्त्रोत

१) हवामान पूर्वानुमान

: प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

२) मागील हवामान

: भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशाळा विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर

ठिकाण : कोल्हापूर

दि. : ०७.०४.२०२०

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकूमौसे, ऐएमएफयु, कोल्हापूर तथा
सहयोगी संशोधन संचालक,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर