



अग्रोमेट अंडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. २६.०२.२०२१

जिल्हा : सांगली

मागील आठवड्यातील हवामान (२०.०२.२०२१ ते २६.०२.२०२१)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (२७.०२.२०२१ ते ०३.०३.२०२१)				
२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	दिनांक	२७	२८	०१	०२	०३
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	-	पाऊस (मिमी)	०	०	०	०	०
२७.२	३०.२	३१.२	३२.७	३४.२	३४.९	-	कमाल तापमान (अं.से.)	३७	३८	३७	३८	३८
१६.४	१९.४	२०.३	१८.९	१८.९	१९.७	-	किमान तापमान (अं.से.)	२१	२२	२३	२२	२२
०	२	२	०	०	०	-	ढग स्थिती (आकाश)	२	०	१	२	१
८०	७७	८३	७९	७३	७१	-	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३९	३१	२५	३२	४५
५५	४८	४८	५७	४५	७१	-	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	१७	१२	११	११	१२
३.७	३.७	१.९	१.९	०.०	०.०	-	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	११	१४	१३	११	१२
-	-	-	-	-	-	-	वाऱ्याची दिशा	प.	ई.	पु.ई.	ई.	पु.

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान संशोधन केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार सांगली जिल्ह्यात दिनांक २७ फेब्रुवारी ते ०३ मार्च दरम्यान हवामान मुख्यतः स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३७ ते ३८ अंश सेल्सिअस दरम्यान तर किमान तापमान ३७.० ३८.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील. वाऱ्याचा वेग ताशी ११ ते १४ कि.मी. दरम्यान राहील.
सामान्य सल्ला		- शेतकरी बांधवांनी हवामान आधारित शेतीविषयक सल्ला आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवर मिळविण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर वरून " मेघदूत" अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन तर मेघगर्जना व विजांचा कडकडाट इ.च्या अंदाजासाठी "दामिनी" अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डाउनलोड करावे व त्याचा वापर करावा. - फळबाग तसेच रब्बी पिकांना आवश्यकतेनुसार पाण्याची उपलब्धता करावी.
संदेश		पक्व गहू, रब्बी ज्वारी व हरभरा पिकांची काढणी करून मळणी करावी व तयार शेतीमाल उन्हामध्ये वाळवून सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा.
गहू	पक्वता	लवकर पक्व होणाऱ्या गहू पिकाची कापणी पिक पक्व होण्याच्या २-३ दिवस आधी करावी त्यामुळे गव्हाचे दाणे शेतात झडण्याचा प्रकार आढळत नाही. कापणीच्या वेळी दाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १५ % असावे.
रब्बी ज्वारी	पक्वता	पक्व झालेल्या ज्वारी पिकाची काढणी करावी. काढणी केलेली कणसे उन्हात वाळवावीत व नंतर मळणी करावी. साठवणुकी पूर्वी ज्वारीचे धान्य उन्हात वाळवावे व साठवणूक करावी.
हरभरा	पक्वता	हरभरा पिक ११० ते १२० दिवसांत तयार होते. घाटे कडक वाळल्यानंतर मगच हरभाऱ्याची काढणी करून मळणी करावी. यानंतर धन्यास ६ ते ७ दिवस कडक ऊन द्यावे व सुरक्षित ठिकाणी साठवून त्यामध्ये कडूनिंबाचा पाला (५%) घालावा त्यामुळे कीड लागत नाही.
ऊस	लागवड	- ऊस खोडवा व्यवस्थापनाकरिता उस तोडणी झाल्यानंतर शेतात उरलेले उसाचे पाचट जाळू नये. किड, रोग व तणग्रस्त लागण क्षेत्र असल्यास खोडवा ठेऊ नये. - सर्वसाधारणपणे १५ फेब्रुवारी पर्यंत तुटलेल्या उसाचाच खोडवा ठेवावा. त्यानंतर घेतलेल्या खोडवा उसावर खोड किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो. - खोडवा उसामध्ये गवताळ वाढीची बेटे दिसून आल्यास त्वरित काढून नष्ट करावीत.
	पूर्वहंगामी	फेब्रुवारीमध्ये सरासरी बाष्पीभवनाचा वेग ५.४९ मी.मी. प्रती दिवस एवढा असतो त्यामुळे ऊस पिकास प्रती दिवस ३.२७ लिटर पाण्याची गरज असते त्यासाठी ठिबक सिंचन संच (४ लिटरचा ड्रिपर) दररोज ४९ मिनिटे चालू ठेवावा.



अॅग्रोमेट अॅडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

द्राक्ष	वाढीची	➤ द्राक्ष मणी वाढ होण्याच्या अवस्थेत असताना बागेस ठिबक सिंचन संचाच्या सहाय्याने प्रती एकर ६८०० ते १०२०० लिटर पाणी प्रती दिवस या प्रमाणे द्यावे. ➤ कोरड्या हवामानाची शक्यता असल्याने कोळी किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे नियंत्रणासाठी सल्फर ८० डब्ल्यू.डी.जी. @ १.५ ते २.० ग्रॅम प्रती लिटर किंवा आबामेक्टीन १.९ ई.सी. @ ०.७५ मिली प्रती लिटर पाणी याप्रमाणात फवारावे.
डाळिंब	वाढीची	➤ मृग बहार : रस शोषक कीटकांचा प्रादुर्भाव जास्त आढळल्यास ल्यॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५% ई.सी. @ ०.५ ते ०.७५ मिली प्रती लिटर पाणी किंवा इंडोक्झाकार्ब १४.५% एस.सी. @ ०.७५ मिली प्रती लिटर पाणी किंवा थाईमेटोक्झाम २५ % डब्ल्यू. जी. @ ०.५ ग्रॅम प्रती लिटर पाणी याप्रमाणात कोणत्याही एका कीटकनाशकाची फवारणी करावी.
	वाढीची	➤ हस्त बहार: खवले कीड प्रादुर्भाव झाल्यास नियंत्रणासाठी सुरवातीच्या अवस्थेत असताना निम तेल १% + पोंगामिया तेल @ ३+३+ प्रती लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
कांदा	वाढीची	➤ कांद्यावरील फुलकिड्यांच्या नियंत्रणासाठी डायमेटोएट ३० % ई.सी. १५ मि.ली. किंवा ल्यॅम्ब्डा सायहॅलोथ्रीन ५ % ई.सी. ६ मि.ली. या कीटकनाशकांच्या प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आलटून पालटून फवारण्या कराव्यात.
हळद	काढणी	➤ हळद पिकाची काढणी जातीनुसार पिकाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर करावी.
जनावरे	वाढीची	➤ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी संकरीत नेपियर गवताची लागवड करावी त्यासाठी फुले जयवंत व फुले गुणवंत या वाणांचा वापर करावा.

स्त्रोत

- १) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.
 २) मागील हवामान : भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशाळा विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर

ठिकाण : कोल्हापूर
 दि. : २६.०२.२०२१

स्वाक्षरीत
प्रमुख अन्वेषक, ग्राकूमौसे, ऐएमएफयु, कोल्हापूर तथा
सहयोगी संशोधन संचालक,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर