



# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## बाजरी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण श्रद्धा (आर.एच.आर.बी.एच. ८६०९)



<b>प्रसारीत वर्ष</b>	१९९० (राज्यस्तरावर)
<b>संशोधन केंद्राचे नाव</b>	म.फु.कृ.वि., राहुरी
<b>जमिन</b>	हलकी ते मध्यम
<b>हवामान</b>	महाराष्ट्रातील बाजरी पिकविणाच्या कोरडवाहू भागासाठी लागवडीसाठी योग्य
<b>पेरणी / लागवडीचा कालावधी</b>	१५ जून ते १५ जुलै
<b>प्रती एकर बियाणे</b>	१.५ किलो
<b>पिकाचा कालावधी</b>	७० ते ७५ दिवस
<b>उत्पादकता</b>	२५ ते २७ किंटल / हे.
<b>वैशिष्ट्य/ गुणधर्म</b>	लवकर पक्क होणारा वाण, ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, घटू कणिस कणसावरील केसांमुळे पक्षापासून संरक्षण, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम

## शांती (आर.एच.आर.बी.एच. ९८०८)



<b>प्रसारीत वर्ष</b>	२००६ (राज्यपातळीवर)
<b>संशोधन केंद्राचे नाव</b>	म.फु.कृ.वि., राहुरी
<b>जमिन</b>	हलकी ते मध्यम
<b>हवामान</b>	पश्चिम महाराष्ट्रातल्या बाजरी पिकविणाच्या क्षेत्रासाठी योग्य
<b>पेरणी / लागवडीचा कालावधी</b>	१५ जून ते १५ जुलै
<b>प्रती एकर बियाणे</b>	१.५ किलो
<b>पिकाचा कालावधी</b>	८० ते ८५ दिवस
<b>उत्पादकता</b>	३० ते ३१ किंटल / हे.
<b>वैशिष्ट्य/ गुणधर्म</b>	मध्यम कालावधीत पक्क होणारा वाण, मध्यम उंचीचा वाण, घटू कणिस ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम, भाकरीची चव रुजकर



# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

धनशक्ती (आर.सी.टी.पी. ८२०३-२-एफ.ई.)



<b>प्रसारीत वर्ष</b>	२०१२ (देश व राज्यपातळीवर)
<b>संशोधन केंद्राचे नांव</b>	म.फु.कृ.वि., राहुरी व ईक्रिस्ट, हैद्राबाद
<b>जमिन</b>	हलकी ते मध्यम
<b>हवामान</b>	बाजरी पिकविणाऱ्या भारतातील क्षेत्रासाठी योग्य
<b>पेरणी / लागवडीचा कालावधी</b>	१५ जून ते १५ जुलै
<b>प्रती एकर बियाणे</b>	१.५ किलो
<b>पिकाचा कालावधी</b>	७४ ते ७८ दिवस
<b>उत्पादकता</b>	२२ किंटल / हे.
<b>वैशिष्ट्य/ गुणधर्म</b>	उच्च लोहयुक्त (८१ पीपीएम) लवकर पक्क होणारा वाण ठोकळ, गोलाकार व राखी रंगचा दाणा गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम

फुले आदीशक्ती (डी.एच.बी.एच. ९०७१)



<b>प्रसारीत वर्ष</b>	२०१५ (राज्यस्तरावर)
<b>संशोधन केंद्राचे नांव</b>	म.फु.कृ.वि., राहुरी
<b>जमिन</b>	हलकी ते मध्यम
<b>हवामान</b>	महाराष्ट्रातील बाजरी पिकविणाऱ्या कोरडवाहू भागासाठी लागवडीसाठी योग्य
<b>पेरणी / लागवडीचा कालावधी</b>	१५ जून ते १५ जुलै
<b>प्रती एकर बियाणे</b>	१.५ किलो
<b>पिकाचा कालावधी</b>	८० ते ८५ दिवस
<b>उत्पादकता</b>	३२ ते ३४ किंटल / हे.
<b>वैशिष्ट्य/ गुणधर्म</b>	मध्यम कालावधीत पक्क होणारा वाण, गोलाकार, ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, घडू कणिस गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम, बीजोत्पादकासांठी फायदेशीर, भाकरी रुचकर



# महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

## फुले महाशक्ती (डी.एच.बी.एच. १२११)



<b>प्रसारीत वर्ष</b>	२०१७ (राज्यस्तरावर)
<b>संशोधन केंद्राचे नांव</b>	म.फु.कृ.वि., राहुरी व ईक्रिस्ट, हैद्राबाद
<b>जमिन</b>	हलकी ते मध्यम
<b>हवामान</b>	महाराष्ट्रातील बाजरी पिकविणाऱ्या कोरडवाहू भागासाठी लागवडीसाठी योग्य
<b>पेरणी/ लागवडीचा कालावधी</b>	१५ जून ते १५ जुलै
<b>प्रती एकर बियाणे</b>	१.५ किलो
<b>पिकाचा कालावधी</b>	८५ ते ९० दिवस
<b>उत्पादकता</b>	२९ ते ३० किंटल / हे.
<b>वैशिष्ट्य/ गुणधर्म</b>	उच्च लोहयुक्त (८७ पीपीएम), ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, घट्ट कणिस, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम

## एम.एच. २११४ (डी.एच.बी.एच. १३९७)



<b>प्रसारीत वर्ष</b>	२०१८ (देशपातळीवर)
<b>संशोधन केंद्राचे नांव</b>	बाजरी संशोधन प्रकल्प, म.फु.कृ.वि., राहुरी
<b>जमिन</b>	हलकी ते मध्यम
<b>हवामान</b>	भारतातील बाजरी पिकविणाऱ्या अ-विभागासाठी (४०० मी.मी. पेक्षा कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या) राजस्थान, गुजरात, हरीयाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व दिल्ली येथे लागवडीसाठी योग्य
<b>पेरणी/लागवडीचा कालावधी</b>	१५ जून ते १५ जुलै
<b>प्रती एकर बियाणे</b>	१.५ किलो
<b>पिकाचा कालावधी</b>	७८ ते ८० दिवस
<b>उत्पादकता</b>	३४ ते ३५ किंटल / हे.
<b>वैशिष्ट्य/ गुणधर्म</b>	मध्यम कालावधीत पक्क होणारा वाण, लांब कणिस, ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम