



शेळ्या, मेंढ्यांच्या आजारावर उपाययोजना

डॉ. रवींद्र निमसे, डॉ. समीर ढगे

पावसाळा हा शेळ्या, मेंढ्यांच्या आरोग्यासाठी एक संवेदनशील कालावधी असतो. या काळात वातावरणातील आर्द्रता, थंडी-उष्णतेतील बदल, ओलसर परिस्थितीमुळे विविध संसर्जन्य व परजीवी आजारांचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढतो. योग्य आरोग्य व्यवस्थापन तसेच नियमित लसीकरण आवश्यक आहे.



शेळ्यांचे आरोग्य आणि आहार व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यावे.

घटसर्प

- जिवाणूमुळे होणारा अत्यंत घातक व वेगाने पसरणारा आजार आहे. विशेषतः भरपूर पोषण किंवा पचन बिघडल्यावर याचा उद्रेक होतो. वेळीच लस दिली नाही, तर शेळ्या, मेंढ्यांमध्ये मृत्युदर अत्यंत जास्त असतो.
- जास्त वयाच्या मेंढीपेक्षा कमी वयाच्या कोकरांमध्ये हा आजार होण्याची शक्यता अधिक असते.

पीपीआर

- संसर्जन्य विषाणूजन्य आजार आहे. यामध्ये ताप येणे, डोळे व नाक वाहणे, तोंडात जखमा, अतिसार आणि मृत्यू होतो.
- विशेषतः ६ महिन्यांपासून पुढील वयातील शेळ्यांमध्ये याचा धोका अधिक असतो. ही लस तीन वर्षांतून एकदा द्यावी.

लाळ्या खुरकूत

- एक विषाणूजन्य आजार आहे. तोंड, जीभ, खुरांवर फोड येतात, त्यामुळे खाणे-पिणे बंद होते. दूध उत्पादन कमी होते. शारीरिक वाढीवर याचा थेट परिणाम होतो.

बाह्य परजीवीमुळे होणारे आजार

- आर्द्रतेमुळे त्वचेवर बुरशी आणि बाह्यपरजीवींचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे त्वचा खाजवणे, केस गळणे, जखमा होणे अशी लक्षणे दिसतात.
- उपाय
 - पशुतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने औषधोपचार करावेत.
 - गोठ्यातील धिंती, कोपरे इत्यादी निर्जंतुक ठेवावेत.

जंत

- पोटात असणारे गोल, चपटे किंवा हुकवर्म प्रकारचे जंत यामुळे अशक्तपणा व वाद खुंटणे अशी लक्षणे दिसतात. हे अंतर परजीवी पावसाळ्यात गवतावर अंडी घालतात, त्यांच्या अब्र्या सक्रिय होतात.

उपाय

- दर सहा महिन्यांनी जंतनाशक शिफारशीत प्रमाणात द्यावे.
- पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर ही प्रक्रिया करणे उपयुक्त ठरते.

लसीकरणाचे वेळापत्रक

पीपीआर

- ३ ते ६ महिन्यांचे वय झाल्यावर एकदा लस द्यावी.

लोळे

- डोळे लालसर होणे, नाकातून साव किंवा श्वसनात अडथळा यासारखी लक्षणे तापासोबत दिसतात.
- पावसाळ्यात लंगडी, खुरांमध्ये फोड, सूज किंवा सड झाल्यास जनावर लंगडते किंवा उठत नाही. दररोज चालण्यावर लक्ष ठेवल्यास ही स्थिती लगेच ओळखता येते.

- खरूज, डाग, बुरशीजन्य संसर्ग यामुळे त्वचेवर चट्टे येतात. खाजवणे, त्वचा सोलवणे, रक्त येणे यासारखी चिन्हे/लक्षणे आढळल्यास त्वचारोगाची सुरुवात झालेली असते.

- अतिसार असल्यास पातळ विष्टा, काळसर किंवा पिवळसर रंग किंवा रक्त मिसळलेली विष्टा दिसते.
- लघवीत रंग बदल, घटसर्पासारख्या आजारांचे द्योतक असू शकतात.

- प्रत्येक जनावराच्या हालचाली लक्षात ठेवण्यासाठी नोंदवही वापरावी.
- तापमापक, नाक-डोळे पुसण्यासाठी स्वच्छ कापड व आवश्यक प्रथमोपचारासाठी औषधे जवळ असावीत.

- एकाच वेळी सर्व जनावरांची तपासणी करण्यापेक्षा त्यांच्या वयोगटानुसार निरीक्षण करून विभागणी करावी.

त्यानंतर दर ३ वर्षांनी बूस्टर डोस द्यावा.

पोटफुगी

- दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला (मे-जूनमध्ये) लस द्यावी.

लाळ्या खुरकूत

- दर ६ महिन्यांनी (जानेवारी आणि जुलै) लस द्यावी.

घटसर्प

- जर मेंढ्या पाणथळ भागात असतील, तर वर्षातून एकदा ही लस द्यावी.

नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी उपाय

लिंबाचा डहाळा

- शेळ्या, मेंढ्यांना आठवड्यातून किमान एकदा तरी लिंबाच्या पाल्याचा डहाळा खावू घालावा. जेणेकरून आंतरपरजीवी कमी होण्यास मदत होते, पचनक्रिया सुधारते.

लसूण

- आहारात थोड्या प्रमाणात ठेचलेला लसूण वापरावा. यामुळे आतड्यांतील जंत कमी होतात. शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

संमिश्र आहार

- प्रथिनयुक्त, खनिजयुक्त आणि जीवनसत्त्वयुक्त आहार देणे रोगप्रतिकारशक्तीस पोषक ठरते.

मिठाचे पाणी

- आठवड्यातून एकदा खारट पाणी दिल्यास पचनक्रिया सुधारते. अंतर्गत कृमींवर काही प्रमाणात नैसर्गिक नियंत्रण मिळते.

इतर खबरदारी

- आजारी जनावरे विलगीकरण करून इतरांपासून वेगळी ठेवावीत.
- कोणतेही नवीन जनावर कळपात आणल्यास लसीकरण व निरीक्षणांनंतरच कळपात मिसळावे.
- खुरांची कापणी, त्वचेची तपासणी आणि केसांची स्वच्छता नियमित करावी.

पायांचे सामान्य विकार

लंगडी

- ही एक जिवाणूजन्य विकृती आहे. चिखल आणि ओलसर जमिनीवर चालल्यामुळे जनावरांच्या खुरांमध्ये जंतुसंसर्ग होतो. त्यामुळे शेळ्या-मेंढ्या लंगडतात. योग्य स्वच्छता, खुरांची कापणी व निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे.

पायांमध्ये सड

- चिखल आणि जंतुसंसर्गांमुळे खुरांमध्ये सूज, सडणे आणि दुर्गंधीयुक्त साव येतो. आजार गंभीर झाल्यास जनावरे हालचाल करणे थांबवतात, खणेपिणे कमी

अथवा बंद होते.

- काही परिस्थितीमध्ये जनावरे दगावण्याची शक्यता असते.

जंत, बुरशी संसर्ग

- पायांच्या फटीत, खुरांच्या तळाशी कीटकांची अंडी व अब्र्या वाढू लागतात. बुरशीमुळे त्वचेला खाज सुटते, सोलवते, सूज येते आणि जखम विचळते.

साप्ताहिक पाय धुण्याची प्रक्रिया

पावसाळ्यात आठवड्यातून एकदा पाय संक्रमक द्रावणामध्ये बुडवून स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.

सोडिशम हायपोक्लोराइट

- एक टक्का द्रावण हे एक शक्तिशाली जिवाणूनाशक आहे. यामुळे खुरांवर असणारे जिवाणू, विषाणू आणि बुरशी नष्ट होतात.

वापर

- १० लिटर पाण्यात सुमारे १०० मिलि सोडिशम हायपोक्लोराइट मिसळावे.
- सर्व जनावरे या द्रावणातून चालवावीत किंवा त्यांचे पाय द्रावणात बुडवावे. द्रावणात २ ते ३ मिनिटे राहू द्यावे. नंतर कोरड्या जमिनीवर उभे करावे.

पोटिशम परमॅंगनेट

- जखमांवर उपचार करणारे, बुरशी नियंत्रणासाठी प्रभावी ठरते.

वापर

- १० लिटर पाण्यात १ ग्रॅम पोटिशम परमॅंगनेट पावडर मिसळून फिकट जांभळे द्रावण तयार करावे. यामध्ये जनावरांचे पाय काही वेळ बुडवावेत.
- हे द्रावण फोड, खरूज आणि पायातील घाण साफ करण्यास उपयुक्त ठरते.

पाय स्वच्छतेसाठी नियमित पद्धती

- दररोज खुरांची तपासणी करावी.
- खुरांवर चिखल साचलेला असल्यास तो लगेच पाण्याने धुऊन घ्यावा.
- खुरांची वाढ वाकडी, अनियमित झाली असल्यास दर ४ ते ६ आठवड्यांनी ती व्यवस्थित कापून आकारात आणावी.
- खुर साळणी करताना सिमेंटच्या चपट्या पृष्ठभागाचा वापर करावा किंवा शिस्तबद्ध खुर-कापणी यंत्राचा वापर करावा.
- पाय स्वच्छ करून लगेचच ओलसर जागेत परत नेल्यास स्वच्छतेचा फायदा होत नाही. त्यामुळे पाय धुतल्यावर जनावरांना काही वेळ वाळू, सुसा किंवा सुकवलेल्या गवताच्या थरावर उभे ठेवावे.

प्रतिबंधक उपाय

- खुरांची जखम लक्षात आल्यास त्यावर लगेच मलम लावावे.
- जखम गंभीर असल्यास पशुवैद्यकाचा सल्ला घ्यावा.
- बाधित जनावरांपासून इतर जनावरे वेगळी ठेवावीत.
- खुरांची मजबुती व पुनरुत्पत्तीसाठी बायोटिन, झिंक आणि कॅल्शियम युक्त खनिज मिश्रण शेळ्या मेंढ्यांच्या आहारात नियमित असणे आवश्यक आहे.

- डॉ. रवींद्र निमसे ९४२२१७९५२५

(पशु वैद्यकीय अधिकारी, पशु संवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, पदव्युत्तर महाविद्यालय, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)

- डॉ. समीर ढगे ९४२३८६३५९६

(विभाग प्रमुख, पशु संवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, पदव्युत्तर महाविद्यालय, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)