



डॉ. मनोज माळी

हळदीच्या दोन्ही गड्ड्यांमधील मोकळ्या जागेमधील माती १.५ ते २ इंच शिपीच्या कुदळीने खणून दोन्ही बाजूच्या गड्ड्यांना लावणे म्हणजेच भरणी करणे होय. भरणी केल्यामुळे नवीन येणारी हळकुंडे झाकली जाऊन त्यांची चांगली वाढ होते. भरणी केल्यामुळे उत्पादनामध्ये वाढ मिळण्यास मदत होते.

सद्यःस्थितीत हळद लागवड होऊन सात महिन्यांचा कालावधी (२१० दिवस) पूर्ण झाला आहे. या कालावधीमध्ये हळद पिकात हळकुंड भरणे ही महत्वाची अवस्था सुरू झालेली असते. या अवस्थेत हळकुंडांची जाडी आणि वजन वाढण्यास मदत होत असते. नव्याने आलेल्या फुटव्यापासून हळकुंड भरण्याचा हा कालावधी असतो. या वेळी वातावरणातील तापमानात घट होत असते. वातावरणात साधारणतः १८ ते २० अंश सेल्सिअस तापमान असते. प्रकाश संश्लेषण क्रियेतून पानांत तयार झालेले अन्नद्रव्ये खोडाद्वारे हळकुंडापर्यंत पोहोचविले जाते. त्यामुळे पिकाची पाने निरोगी राहणे अत्यंत गरजेचे असते.

हळद पिकाच्या योग्य वाढीसाठी सद्यःस्थितीत आंतरमशागतीची कामे वेळेवर करणे गरजेचे आहे. या कामांमध्ये अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन, सिंचन व्यवस्थापन, तणांचे नियंत्रण, फुलांचे दांडे न काढणे इत्यादी महत्वाच्या कामांचा समावेश होतो. तापमान जास्तच कमी झाले तर हळद पिकावर विविध किडी-रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गड्ड्यांची संख्या आणि आकार यावर परिणाम होतो. यामुळे एकूण

## सद्यःस्थितीत हळदीमध्ये करावयाचे व्यवस्थापन



हळदीला आलेले फुलांचे दांडे काढू नयेत.



योग्यरीत्या भरणी न केल्यास हळकुंड उघडे राहून सूर्यप्रकाशामुळे खराब होतात. अशा कंदावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव लवकर होतो.

**छोट्या जाहिराती**

कंपनि/कार्ड क्र. १२३४५६७८९०  
२२२२ + ११११  
२२२२ + ११११  
२२२२ + ११११  
२२२२ + ११११

**बी - बियाणे**

**व्यवसायविषयक**

**व्यापणे / रोपे विक्री**

**व्यवसाय धंदा**

**नोकरी विषयक**

**नोकरी देणे**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

**वाद्यकासाठी निवडून**

### आंतरमशागत (भरणी करणे)

- हळद पिकाला मातीची भर लावलेली नसेल तर फुटव्यापासून नव्याने आलेले हळकुंड उघडे राहतात. हळकुंड सूर्यप्रकाशाच्या सानिध्यात राहिल्यास हिचे पडून वाढ खुंटते. तसेच कंदमाशीसारख्या किडी उघड्या हळकुंडावर किंवा गड्ड्यांवर अंडी घालतात. त्यामुळे कंदकुज रोगाचा प्रसार होतो. त्यामुळे भरणी करावची राहिली असल्यास तत्काळ मातीची भर लावून हळकुंडे संपूर्णपणे झाकून घ्यावीत. त्यामुळे हळकुंडांचे चांगले पोषण होऊन ती चांगली पोसतात.
- हळदीच्या दोन्ही गड्ड्यांमधील मोकळ्या जागेमधील माती १.५ ते २ इंच शिपीच्या कुदळीने खणून दोन्ही बाजूच्या गड्ड्यांना लावणे म्हणजेच भरणी करणे होय. भरणी केल्यामुळे नवीन येणारी हळकुंडे झाकली जाऊन त्यांची चांगली वाढ होते. भरणी केल्यामुळे उत्पादनामध्ये वाढ मिळण्यास मदत होते.
- गादीवाप्यावर भरणी करताना पांवर टिलरच्या साठ्याने किंवा दोन गादीवाप्यांमधील जागेतील माती मोकळी करून करून गादीवाप्यावर भर घ्यावी. त्यामुळे मजुरांच्या खर्चात बचत होण्यास मदत होते. गादीवाप्यावर ठिबक सिंचन केले असल्यास भरणी करताना झिपर मातीखाली जाणार नाहीत याची दस्तक घ्यावी.

हळकुंडाच्या उत्पादन आणि गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यासाठी सद्यःस्थितीत हळद पिकात नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

### अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन

शाकीय वाढ पूर्ण झाल्यानंतर हळद पिकास कोणतेही नत्रयुक्त रासायनिक खत जसे युरिया देऊ नये. युरियासारखी खते दिल्यास हळदीची अतिरिक्त शाकीय वाढ होते. परिणामी हळद पिकाची पुढील अवस्था जसे हळकुंड भरणे, हळकुंडाची जाडी आणि वजन वाढणे लांबणीवर पडते. ज्याठिकाणी पोर्टशयुक्त खतांची कमतरता असेल तेथे हेक्टरी १२५ किगो पांढरा पोर्टश घ्यावा. त्यामुळे हळकुंडांचे वजन वाढून हळकुंडांना चकाकी येते.

### सिंचन व्यवस्थापन

- हळद पिकात उत्पादनाचा मुख्य स्रोत जमिनीत वाहणारे कंद असल्यामुळे मातीचे प्रमाण, सेंद्रिय पदार्थ, हवा आणि पाणी यांचे संतुलन राखावे. जमिनीत केवळ

मातीचे कण राहिले तर जमीन कोरडी होऊन मुळांच्या वाढीला वाव मिळत नाही. जमिनीत पाणी जास्त झाले तर जास्त ओलाव्यामुळे कंद कुजण्याचे प्रमाण वाढते.

- रुंद वारंबा पद्धतीने लागवड असल्यास ठिबक सिंचनाचा वापर अत्यंत फायदेशीर ठरतो. ठिबक सिंचनाच्या वापरामुळे पाण्याचा अपव्यय टक्कून जमिनीचे जैविक गुणधर्म सुधारण्यास मदत होते. मुळांपाशी जमिनीमध्ये वाफसा लवकर आणि जास्त तयार होतो, सूक्ष्मजीवांच्या क्रिया सुधारतात. मातीची सच्छिद्रता आणि
- जलधारणक्षमता वाढते. त्यामुळे अन्नद्रव्यांचे वहन सुलभ होऊन हळद पिकांच्या मुळांबाहे शोषण अधिक होते. याचे एकूण परिणाम पिकावर दिभून येतात. सूक्ष्म पाने लवकर मोठी होतात, हळद उत्पादनात वाढ होऊन हळदीचा मुख्य गुणवत्ता घटक कुरकुमीनचे (रंजक द्रव्य) प्रमाण वाढण्यास मदत होते.
- जमिनीतील ओलाव्यानुसार ठिबक सिंचन चालू ठेवावा. सतत पाणी सोडू नये. सतत ओलावा राहिल्याने हळकुंडे कुजण्याची शक्यता असते. ठिबक सिंचनाने

पाणी दिल्यास उत्पादन वाढीस चालना मिळते.

- सद्यःस्थितीत पाण्याच्या दोन पाळ्यांमधील अंतर १२ ते १५ दिवसांचे ठेवावे. पाऊस समाधानकारक असेल तर हळदच्या ते मध्यम जमिनीत पाण्याच्या १३ ते १५ पाळ्या घाव्या लागतात. शिफारशीत मात्रेपेक्षा पाण्याचे प्रमाण कमी पडले तर हळदीच्या कंदांची योग्य वाढ होत नाही. प्रक्रियेनंतर अशा हळकुंडांचा रंग पिका पडतो, चमक घटते. हळद पिकास आठ महिने होईपर्यंत जमिनीच्या मगदूमप्रमाणे सिंचनाचे नियोजन करावे. कंद पोसण्याच्या कालावधीमध्ये पिकाची पाण्याची गरज मर्यादित होत जाते.

### फुलांचे दांडे न काढणे

शाकीय वाढ पूर्ण झाल्यानंतर हळदीला फुले येण्यास सुरुवात होते. काही जातींना जास्त, तर काही जातींना कमी प्रमाणात फुलांचे दांडे येतात. हळदीला फुले येणे म्हणजे हळदीच्या शाकीय वाढीचा कालावधी संपून कंद सुटण्यास सुरुवात झाल्याचे लक्षण असते. फुलांचे दांडे तसेच झाडावर ठेवल्यास हळद पिकाला त्याचा कोणताही तोटा होत नाही. फुलांचे दांडे काढणे ही प्रक्रिया खर्चिक आहे. संशोधनानुसार हळद पिकावर फुलांचे दांडे असल्यामुळे उत्पादनात कोणत्याही प्रकारे घट येत नाही, असे निदर्शनास आले आहे. तसेच फुलांचे दांडे ही न संपणारी क्रिया आहे. त्यामुळे एकदा दांडे काढले तरी ते नव्याने येतच राहतात. फुले काढताना हळद पिकाच्या खोडाला इजा होते. या जखमेतून दुय्यम बुरशीचा पिकात शिरकाव होऊन कंदकुज रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. त्यासाठी हळदीला आलेली फुले काढू नयेत.

- डॉ. मनोज माळी, ९४०३७७३६१४  
(लेखक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी  
अंगरंग हळद संशोधन केंद्र, क. डिग्रज, जि. सांगली  
येथे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.)