



छायाचित्रांद्वारे पीक संरक्षण



रवींद्र पालकर

मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळी



अंडी अवस्था




अळी अवस्था



अळी अवस्था

किडीची ओळख

- **अंडी अवस्था :** अंडी गोलाकार, फिकट पांढर ते पिवळसर रंगाची असून, पुंजक्याच्या स्वरूपात आढळतात. पुंजक्यावर मादीच्या शरीरावरील सूक्ष्म केस व खवले असल्याने तो पांढर किंवा राखाडी दिसतो. उबविण्यापूर्वी अंड्यांचा रंग गडद होतो.
- **अळी अवस्था :** सुरुवातीला अळी फिकट हिरवट, तर पूर्ण वाढीनंतर हिरवट ते तपकिरी रंगाची दिसते. डोक्यावर उलट्या 'Y' आकाराची पांढरी रेषा आणि शेवटच्या भागावर चौकोनी रचनेतील चार काळे ठिपके ही प्रमुख ओळखचिन्हे आहेत. शरीराच्या बाजूने पिवळसर रेषा दिसतात. पूर्ण वाढलेली अळी सुमारे ३.५ सेंमी लांब असते.
- **कोषावस्था :** कोष सुरुवातीला फिकट लालसर-तपकिरी असून, नंतर गडद लालसर तपकिरी रंगाचा होतो. कोष




प्रीठ अवस्था (नर)

- साधारण १.३ ते १.५ सेंमी लांब असतो.
- **प्रीठ अवस्था (पतंग) :** प्रीठ पतंगाचे पुढील पंख तपकिरी किंवा राखाडी रंगाचे असतात. नर पतंगाच्या पुढील पंखांवर विशिष्ट पांढरे ठिपके व रेषा दिसतात, तर मादीचे पंख तुलनेने एकसारखे तपकिरी दिसतात. मागील पंख फिकट पांढरे असून, त्यांच्या कडा गडद रंगाच्या असतात. पतंग



प्रीठ अवस्था (मादी)



कोष अवस्था

प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असतो.

जीवनचक्र

मादी पतंग पानांच्या वरच्या किंवा खालच्या बाजूस पुंजक्याने अंडी घालते. एका पुंजक्यात साधारण १०० ते २०० अंडी असतात. एक मादी तिच्या आयुष्यात १५०० ते २००० अंडी घालू शकते. अंडी २ ते ३ दिवसांत उबतात.

अव्या सह्य रूपांतरित अवस्थेत वाढून १४ ते १५ दिवसांत पूर्ण वाढतात. पूर्ण वाढलेली अळी जमिनीत जाऊन कोषावस्थेत जाते. कोषावस्था ८ ते ९ दिवसांची असते. त्यानंतर प्रीठ पतंग बाहेर पडतो. प्रीठ नराचा जीवनकाळ सुमारे ८ दिवस, तर मादीचा १० ते ११ दिवस असतो. अशा प्रकारे किडीचे जीवनचक्र साधारण ३२ ते ३८ दिवसांत पूर्ण होते.

नुकसानीचे स्वरूप : नुकत्याच अंड्यातून बाहेर पडलेल्या अव्या पानांच्या हिरवा पत्र्यात खरवडून खातात, त्यामुळे पानांवर पांढरे चट्टे पडतात. पुढील अवस्थेत अव्या पानांना छिद्रे पाहून खातात, तर मोठ्या अव्या पानांच्या पोण्यात राहून पानांचा फडशा पाडतात. त्यामुळे पाने उपडल्यानंतर एका रेषेत समान छिद्रे दिसतात. पानावर अळीची चिन्हा दिसते. प्रादुर्भाव वाढल्यास पानांच्या केवळ शिरा शिल्लक राहून पीक फाटल्यासारखे दिसते. मक्याच्या कणसावरील अळीचा प्रादुर्भाव होऊन नुकसान होते.

एकात्मिक व्यवस्थापन

- पीक काढणीनंतर खोल नांगरट करून जमिनीतील कोष नष्ट करावेत.
- पुढील हंगामात पीक फेरपाळट करावा व शेत तणमुक्त ठेवावे.
- पिकाची नियमित पाहणी करून अंडीपुंज व लहान अव्या दिसताच वेळून नष्ट कराव्यात.
- शेतात एकरी १० पक्षियांचे व १ प्रकरा सापळा उभारावा.
- फलगांच्या निरीक्षणासाठी एकरी ५, तर निवंगणासाठी १५ कामगंध सापळे लावावेत.
- सापळ्यात सरासरी ३ नर पतंग प्रति सापळा आढळल्यास

- परोपजीविप्रस्त टेलिओमस रेगसची ५० हजार अंडी प्रति एकर या प्रमाणे आठवड्याच्या अंतराने तीन वेळा सोडावीत.
- बॅम्पोलेटियम क्लोरीडी, चेलेनस फार्मोर्मियम, एन्डोरोस्टा झॅन्थिमिस, ऑल ओइस प्रजाती, कोक्किजिडियम मेलेग्रियम आणि कोटेगिया रुफिग्रस यांसारख्या भिक्कीटकांचे संवर्धन करावे.
- जैविक नियंत्रणासाठी मेटारायझीम रिटार्ड किंवा मेटारायझीम अग्निसोप्री (१.१५ टक्का विद्राव्य पावडर) ५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाणी या प्रमाणात फवारवी.



अळीने पानावर केलेले सरळ रेषेतील छिद्रे. नैसर्गिकरीत्या संक्रमित एस. एफ. एन. पी. व्ही. विषाणुप्रस्त अळी.

आर्थिक नुकसान पातळी

- रोपावस्था ते सुरुवातीची पोषावस्था : उगवणीनंतर दोन आठवड्यांपर्यंत सलग तीन दिवस ३ नर पतंग प्रति सापळा किंवा ५ टक्के प्रादुर्भावप्रस्त झाडे.
- मध्य पोषावस्था : उगवणीनंतर २ ते ४ आठवड्यांत ५ ते १० टक्के प्रादुर्भावप्रस्त झाडे.

किडीने आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडल्यास पिकाच्या अवस्थेनुसार शिफारशीत कीटकनाशकाची फवारणी पोष्यामध्ये व्यवस्थित करावी. चार पिकांमध्ये रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी टाळावी.

शिफारशीत कीटकनाशके

कीटकनाशक	प्रमाण प्रति लिटर पाणी
स्प्रिनेटोराम (११.७० टक्के एस.सी.)	०.५ मि.लि.
ब्रोफ्लोनेलझ (२० टक्के एस.सी.)	०.२५ मि.लि.
क्लोअॅन्ट्रानिलीप्रोल (१८.५० टक्के एस.सी.)	०.४ मि.लि.
आयसोसायलोसेराम (१८.१ टक्के एस.सी.)	०.६ मि.लि.
टेन्ट्रानिलीप्रोल (१८.१ टक्के एस.सी.)	०.५ मि.लि.
क्लोअॅन्ट्रानिलीप्रोल (९.३० टक्के) अधिक लॅम्बडा-सायहॅलोथ्रिन (४.६० टक्के झेड.सी.) (संयुक्त कीटकनाशक)	०.५ मि.लि.
क्लोअॅन्ट्रानिलीप्रोल (१० टक्के) अधिक नोव्हाल्युरॉन (२० टक्के एस.सी.) (संयुक्त कीटकनाशक)	०.६ मि.लि.
सायअॅन्ट्रानिलीप्रोल (१६.९ टक्के) अधिक ल्युफेन्थुरॉन (१६.९ टक्के एस.सी.)	०.३ मि.लि.
एमावेक्टिन बेझोएट (५ टक्के) अधिक ल्युफेन्थुरॉन (४० टक्के डब्ल्यू.जी.) (संयुक्त कीटकनाशक)	०.१६ ग्रॅम.
नोव्हाल्युरॉन (५.२५ टक्के) अधिक एमावेक्टिन बेझोएट (०.९ टक्का एस.सी.) (संयुक्त कीटकनाशक)	३ मि.लि.
क्लोअॅन्ट्रानिलीप्रोल (६.५ टक्के) अधिक ल्युफेन्थुरॉन (५ टक्के) अधिक एमावेक्टिन बेझोएट (२ टक्के एस.सी.) (संयुक्त कीटकनाशक)	१.५ मि.लि.
(सर्व कीटकनाशकांना लेबल क्लेम आहेत.)	