



सी. बी. बाचकर



डॉ. एस. एम. गांगुर्डे



बी. टी. पाटील

फुलकिडी, मावा यांना अटकाव



पांढरी माशीचा टोमॅटोवरील प्रादुर्भाव.

टोमॅटो पिकामध्ये सद्यस्थितीत फुलकिडे, पांढरी माडी व मावा या किडींचा प्रादुर्भाव आढळत आहे, या किडींच्या नियंत्रण व्यवस्थापनाची माहिती घेऊयात.

फुलकिडे



टोमॅटोवरील फुलकिडे

फुलकिडांच्या श्रौंस टबॅकी, स्क्रिटोथ्रोप्स डोरसॉलिस, फ्रॅक्लिनिडेल्ला शुल्टझीई (Frankliniella schultzei) या प्रमुख प्रजाती असून, त्या मिरची, कांदा, टोमॅटो, वांगी, भेंडी, कपाशी, भुईमूग इ. अनेक पिकांवर आढळतात.

ओळख : ही कीड अतिशय छोटी, निमुळती व नाजूक असते. फिकट पिवळी किंवा करड्या रंग, लांबी एक मि.मी. पेक्षा कमी असते. प्रौढांना पंख असतात. पिलांना पंख नसल्यामुळे पानांवर इकडून तिकडून पळताना दिसतात.

नुकसानीचा प्रकार

या किडीची पिले व प्रौढ पाने खरवडून त्यातून बाहेर येणारा रस शोषून घेतात. खरवडलेला भाग प्रथम पांढुरका होतो व नंतर तपकिरी होतो. अशी पाने आकस्मात, झाडाची वाढ खुंटते. किडीचा प्रादुर्भाव कोरड्या हवामानात जास्त होतो. हे कीटक स्पॉटिड विन्ट या विषाणूजन्य रोगाचा प्रसार करतात.

पांढरी माशी

शास्त्रीय नाव - बेमिसिया टॅबॅकी

ही बहुपिकभक्षीय कीड असून, वांगी, टोमॅटो, मिरची, भेंडी, वेलवर्गीय भाज्या, कपाशी, सूर्यफूल इ. अनेक पिकांवर उपजीविका करते.

ओळख व जीवनक्रम

- अंडी अवस्था : अंडे उभट आकाराचे २ मि.मी लांब, नारिंगी रंगाचे असून ते साध्या डोळ्यांना दिसत नाही.

नाही.

पिलावस्था :

- गोलाकार, पिवळसर असून विशेषतः जमिनीगत असलेल्या जुन पानाच्या खालील बाजूस जास्त असतात.
- कोष अवस्था : ही पानाच्या खाली असते.
- प्रौढ माशी : पांढऱ्या रंगाची मासा पानाच्या खालील आणि वरील बाजूस दिसतात.

लक्षणे व नुकसानीचा प्रकार

- पिले व प्रौढ पानातील रस शोषून घेतात. त्यामुळे पाने पिवळी पडून वाळतात.
- माशीच्या शरीरातून सवलेल्या गोड द्रव पदार्थांमुळे पानावर काळ्या बुरशीची वाढ होते. पाने काळी पडतात. पर्यायाने कर्बप्रहणाची क्रिया मंदावते.
- हे कीटक लीफ कर्ल (पर्णगुच्छ) या विषाणूजन्य या रोगाचा प्रसार करतात.

मावा

मावा किडीच्या अनेक प्रजाती असून, त्यापैकी ऑफिस गॉसिपी, मायझस पर्सिकी या प्रजाती टोमॅटो पिकावर आढळतात. वांगी, भेंडी, वाल, वेलवर्गीय भाज्या, बटाटे, मिरची इ. पिकावर हे कीटक जगतात.

ओळख व जीवनक्रम

- कीटक गोलाकार, पिवळसर, २ ते ३ मि.मी. आकाराचे पानाच्या खाली पुंजक्याने बसलेले आढळतात. हे जास्त हालचाल करीत नाहीत.
- पिले आणि प्रौढ पानातील रस शोषतात. त्यामुळे पाने पिवळी पडतात. पाने निस्तेज होतात. पानाच्या कडा खालील बाजूस वळतात.
- या किडीमुळे कुकुम्बर मोडक विषाणूचा प्रसार होतो.



मावा

- कीडनाशकांच्या शिफारशी लेबल क्लेमप्राप्त किंवा जॉइंट अग्रेसकोप्राप्त आहेत. • फवारणीचे प्रमाण हाय व्हॉल्यूम फवारणी पंपासाठी आहे. • खरेदीवेळी पक्के बिल घ्यावे. • बॅन किंवा 'रेस्ट्रिक्टेड' आहे का पाहावे. • लेबल क्लेम वाचावेत. • पुरेशा ज्ञानाशिवाय रसायने एकमेकांत मिसळू नयेत. • रसायनांचा गट तपासावा. • पीएचआय, एमआरएल तपासावेत. • पेरणी वा लागवडीपूर्वी संबंधित बियाणांवर कोणती बीजप्रक्रिया केलेली आहे, हे तपासूनच पुढील बीजप्रक्रिया करावी.


- मधमाशी, मित्रकीटांना हानिकारक कीडनाशकांचा वापर टाळावा.
- पीक फुलतेच अवस्थेत लक्षात घेऊन कीडनाशकांचा समजसत वापर करावा.

एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

- ज्या शेतात पूर्वी तूर, कपाशी हरभरा, वांगी, मिरची पिके घेतली असतील, तिथे टोमॅटो पिकाची लागवड करू नये.
- शेताची खोल नांगर करावी.
- रोपांची निगा रोपे तयार करताना रोपांच्या वाफ्यावर मसलून किंवा नाथलून कापडाचे आच्छादन घालावे. म्हणजेच रोपांचे रस शोषक किडीपासून संरक्षण होते.
- टोमॅटोची रोपे तयार करण्यापूर्वी झेंडूची रोपे तयार करावीत. टोमॅटोच्या पुनर्लागवडीपूर्वी टोमॅटोच्या प्रत्येक १० ओळीत झेंडू लावावीत.

- टोमॅटोची पुनर्लागवड करण्यापूर्वी रोपे जैविक घटकांचे मिश्रण (फुले सुपर बायोमिक्स) ५० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाणी या प्रमाणाच्या द्रावणात १०-१५ मिनीट बुडवून नंतर लावावीत.
- लागवडीनंतर ३० दिवसांनी पिकावर रसशोषक किडीचा प्रादुर्भाव दिसू लागताच निंबोळी अर्क (५ टक्के) फवारणी करावी.
- शेतामध्ये एकरी २० ते २५ पिवळे चिकट सापळे लावावेत.
- रासायनिक नियंत्रण
- या रसशोषक किडीच्या नियंत्रणासाठी, सायअॅन्ट्रानिलिप्रोल (१०.२६ टक्के ओडी) १८ मि.लि. किंवा फ्लोनिक्मिड (५० टक्के डब्ल्यूजी) ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाणी या प्रमाणे फवारणी करावी. (टीप - कीडनाशक फवारणीचे प्रमाण हाय व्हॉल्यूम पंपासाठीचे आहे.)

डॉ. एस. एम. गांगुर्डे • ९४०३९८९१०२ (डॉ. गांगुर्डे हे कनिष्ठ कीटकशास्त्रज्ञ, प्रा. बाचकर हे कनिष्ठ रोगशास्त्रज्ञ आणि प्रा. पाटील हे वरीष्ठ भाजीपाला पैदासकार म्हणून अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प - भाजीपाला पिके, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे कार्यरत आहेत.)



दिवसेंदिवस पाण्यातील क्षारांच्या प्रमाणात वाढ होत आहे व त्यामुळेच पाण्याचा सामू देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी फवारणीच्या औषधांची क्रियाशीलताही कमी होत आहे. संशोधनाअंती असे दिसून आले आहे की, फवारणीच्या पाण्याचा आदर्श सामू हा ५.५ ते ६.५ असावा जेणेकरून फवारणीची क्रियाशीलता व पिकांची शोषणक्षमता टिकून राहील. या गोष्टीचा विचार करूनच 'पूव' ने आपल्यासाठी तयार केले आहे डेकोरस...


डेकोरस चे वैशिष्ट्ये आणि फायदे :

- pH** पाण्याचा पी.एच. कमी करते, फवारणी परिणामकारक होते.
- पाण्याचा सामू कमी होऊन पाणी फवारणी योग्य होते.
- फवारणीच्या द्रावणाचा ५.५ ते ६.५ हा आदर्श सामू मानला जातो.
- फवारणी द्रावणाची कार्यक्षमता वाढवते.

आधुनिक पीएच. बॅलेंसर।

फवारणी मिश्रणाचा तोल सांभाळतो.

तणनाशकांसोबत तर अवश्य वापरून फरक अनुभवा !



योग्य pH योग्य स्प्रे उत्तम रिझल्ट

- मिश्रणाचे शोषण होण्यास तुरन्तता मिळते
- फवारणी अधिक प्रभावी ठरते
- पाण्याची जडता व प्रतिक्रिया कमी करते

पूव क्रमिक पा.नि. +91 7722030259 +91 8569978202

वेब: www.poorvachemtech.in ईमेल: poorvachemtech@yahoo.com