



गुलाबावर ब्लॅक वाइन थ्रीप्सची नोंद



छायाचित्रांद्वारे
पीक संरक्षण

रवींद्र पालकर

वाढते तापमान आणि पोषक वातावरणामुळे सध्या पिकांमध्ये फुलकिडींचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. गुलाबावरही विविध फुलकिडी आढळतात. यंदा ब्लॅक वाइन थ्रीप्स या किडीचा प्रादुर्भाव गुलाबावर प्रकर्षाने दिसून येत आहे. या किडीची सविस्तर शास्त्रीय ओळख करून घेणे महत्वाचे ठरणार आहे.

ब्लॅ

क वाइन थ्रीप्स या नावाने ओळखली जाणारी फुलकीड पानांतील रस शोषून पिकाचे नुकसान करते. प्रादुर्भावामुळे पानांवर फिकटपणा व चट्टे दिसून येतात आणि पीक वाढीवर परिणाम होतो.

- किडीचे सामान्य नाव : द्राक्षावरील काळी फुलकीड (Black vine thrips)
- शास्त्रीय नाव : *रेटिथ्रिप्स सिरिअकस* (*Retithrips syriacus*)
- गण (Order) : थायसॅनोप्टेरा (Thysanoptera)
- कुळ (Family) : थ्रिपिडी (Thripidae)
- नुकसानकारक अवस्था : अळी व प्रौढ.
- यजमान पिके व वनस्पती : बहुमक्षी कीड. द्राक्ष, गुलाब कपाशी, एरंडी, पेरू, निलगिरी आदी ५० हून अधिक पिके व वनस्पतींवर किडीची नोंद.
- नुकसानकारक अवस्था : अळी व प्रौढ

ओळख

अंडी अवस्था : प्रति मादी ४० ते ६० या प्रमाणात गुलाबाच्या पानांच्या उर्तीमध्ये, प्रामुख्याने पानाच्या बाह्य त्वचेखाली अंडी घालते. अंडी घातलेल्या जागेवर विष्टेचा



रसशोषणामुळे दिसणारे चंदेरी ठिपके व व्रण.



किडीची पहिली अवस्था (पहिली इन्स्टार)



दुसरी इन्स्टार



पूर्वकोष अवस्था



किडीचा प्रौढ



कोष अवस्था

(सर्व छायाचित्रे : रवींद्र पालकर)

अपारदर्शक द्रवाचा थर दिसून येतो.

किडीच्या अवस्था

- अळी - नवजात अळी सुरुवातीला पारदर्शक असून, पुढे पिवळसर-केशरी ते लालसर रंगाची होते. लांबी ०.३५ ते १.३० मि.मी. असते. उदराच्या टोकावर विष्टेचा थेंब दिसून येतो.
- कोष - दुसरी अळी अवस्था पूर्ण झाल्यानंतर पूर्वकोष पानाच्या खालील बाजूस, शिरेलागत किंवा कोपऱ्यात

नियंत्रण

- शेतातील तणनियंत्रण करावे.
- नत्रयुक्त खातांचा संतुलित वापर करावा.
- निळ्या चिकट सापळ्यांचा वापर करून किडीचे नियमित सर्वेक्षण करावे.
- मित्रकीटकांचे संवर्धन करावे.
- रासायनिक उपाय (प्रमाण प्रति लिटर पाणी)
- डायमथोएट (३० टक्के ईसी) २.६४ मि.लि. (लेबल बलेम आहे.)

मोटी व भरदार असते. प्रौढांची उडण्याची क्षमता कमी असते.

जीवनक्रम

किडीचा जीवनक्रम अंडी, अळी, पूर्वकोष, कोष व प्रौढ या अवस्थांतून पूर्ण होतो. अंडी ४ ते ५ दिवसांत उबतात. अळीच्या दोन अवस्था ७ ते ९ दिवसांत, पूर्वकोष अवस्था सुमारे एक दिवसात तर कोष अवस्था २ ते ३ दिवसांत पूर्ण होते. प्रौढ कीड १० ते २० दिवस जगते. अनुकूल परिस्थितीत संपूर्ण जीवनक्रम साधारण २४ ते ३७ दिवसांत पूर्ण होतो.

पोषक वातावरण

उष्ण व तुलनेने कोरडे हवामान, कमी पाऊस व मध्यम सापेक्ष आर्द्रता हे हवामान किडीच्या प्रादुर्भावास पोषक ठरते.

नुकसान

अळी व प्रौढ फुलकिडे गुलाबाच्या पानांवर राहून पानातील पेशींतील रस शोषतात. त्यामुळे पानांवर सुरुवातीला सूक्ष्म चंदेरी ठिपके व व्रण दिसतात. प्रादुर्भाव वाढल्यास हे ठिपके एकत्र येऊन पाने चंदेरी-रुपेरी व निस्तेज दिसू लागतात. प्रादुर्भावग्रस्त भागावर काळ्या विष्टेचे ठिपके दिसून येतात. तीव्र प्रादुर्भावामुळे पाने आकसून वाळतात व गळून पडतात. परिणामी प्रकाशसंश्लेषणाची कार्यक्षमता कमी होऊन झाडाची वाढ व फुलांची गुणवत्ता घटते.

आढळतो. या अवस्थेत अन्नग्रहण होत नाही. शरीर लालसर, डोके व पाय पिवळसर असून पंखांच्या कळ्या विकसित होतात. लांबी १.१० ते १.१५ मि.मी. व रुंदी सुमारे ०.५० मि.मी. असते. कोष पूर्वकोषासारखाच दिसतो; मात्र संयुक्त डोळ्यांतील सूक्ष्म नेत्रक (facets) स्पष्ट असतो. स्पर्शिका मागे व डोळ्याला लागून असतात. पंखांच्या कळ्या उदराच्या जवळपास अर्ध्या भागापर्यंत वाढलेल्या असतात. शरीरावरील रोम (setae) स्पष्ट दिसतात. कोष तेजस्वी लालसर, डोके व पाय पिवळसर आणि पंखांच्या कळ्या फिकट तपकिरी असतात. कोषाची लांबी १.१० ते १.३५ मि.मी. व रुंदी सुमारे ०.५० मि.मी. असते.

- प्रौढ - प्रौढ फुलकीड लहान, सडपातळ व काळ्या रंगाचा असून पंख फिकट व त्यावर गडद ठिपके दिसतात. शरीराची लांबी १.३ ते १.५ मि.मी. असते. नर मादीपेक्षा लहान व सडपातळ असतो. मादी तुलनेने



तीव्र प्रादुर्भावामुळे पाने चंदेरी-रुपेरी व निस्तेज दिसतात.

रवींद्र पालकर ८८८८४०६५२२
(पोपच. डी. स्कॉलर, कीटकशास्त्र विभाग,
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)