



बोर पिकावर 'कॉमन रेड फ्लॅश' अळीची नोंद



छायाचित्रांद्वारे
पीक संरक्षण

रवींद्र पालकर

'कॉमन रेड फ्लॅश' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या फुलपाखराची प्रथम शास्त्रीय नोंद जोहान ख्रिश्चन फॅब्रिसियस यांनी १७८७ मध्ये सिलियम (सध्याचे डायलंड) येथून केली. त्यांनी या प्रजातीचे शास्त्रीय नाव 'पॅपिलिओ इआरबस' असे ठेवले. पुढील कृषिक्षेत्रात्मक अभ्यासानंतर सध्या ही प्रजाती 'रापाला इआरबस' या नावाने ओळखली जाते. दक्षिण आशियापासून जमने आशियापर्यंत आढळणाऱ्या या फुलपाखराची अडी बहूषा असून विविध जंगली वनस्पतीवर तिची नोंद आढळते. झिझिफस स्पासा म्हणजेच तोरण किंवा तोरणो ही खाद्य वनस्पती म्हणूनही शास्त्रीय लेखांमध्ये नोंदवलेली आहे. महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यात बोराच्या झाडावर ही अळी पाने आणि फळे खाताना आढळून आली. बोर पिकावरील या अळीच्या खाद्यक्रियेची ठोस नोंद उपलब्ध नसल्याने हे निरीक्षण महत्वाचे ठरते. मात्र तिचा महाराष्ट्रभर प्राप्ताव असल्याचे सध्या तरी म्हणता येत नाही. बोरावरील तिची यजमान पसंती आणि प्रत्यक्ष नुकसान किती आहे, या बाबतून येण्यासाठी पुढील अभ्यास आवश्यक आहे. या लेखातून क्षेत्रीय निरीक्षण आणि प्रयोगशाळेतील संशोधनाच्या आधारे घेतलेल्या छायाचित्रांद्वारे या किडीच्या जीवनचक्रातील विविध अवस्था आणि त्यांची ओळख जाणून घेऊया.

किडीचे सामान्य नाव : कॉमन रेड फ्लॅश
(Common Red Flash)


शास्त्रीय नाव : रापाला इआरबस (*Rapala iarbhus*)

गण (Order) : लेपिडोप्टेरा (Lepidoptera)
कुळ (Family) : लायसिनिडी (Lycaenidae)
नुकसानकारक अवस्था : अळी.

किडीची ओळख

- अंडी : मादी पानावर, देठावर किंवा कोवळ्या फुटण्यावर एकेकटे अंडे घालते. अंडे सुमारे ०.६ मि.मी. व्यासाचे, हिरवे, चपटे व गोलाकार असते. एका टोकाला गर्भद्वाराचा भाग किंचित खोल्यात असतो व पृष्ठभागावर जाडोसरखी सूक्ष्म नली दिसते.
- अळी : नवजात अळी फिकट पिवळसर-तपकिरी असून सुमारे १.१ मि.मी. लांब असते. डोके व पहिल्या छातीच्या खंडावर काळ्या रंगाची डाळीसारखी चकती असते, तर शरीरावर तपकिरी पट्टे व सूक्ष्म केस असतात. वाडीबरोबर शरीराचा रंग पिवळसर हिरवा होतो आणि पांढऱ्या कडा असलेल्या तिरब्या पाखरीपा स्पष्ट दिसू लागतात. पुढील अवस्थांमध्ये शरीरावर सूक्ष्म केसांचे ढुपक असलेले शंक्या आकाराचे उंचवटे दिसतात. पूर्ण वाढ झालेली पाचव्या अवस्थेतील अळी सुमारे १६ मि.मी. लांब असून फिकट हिरव्या रंगाची असते.
- कोष : पूर्ण वाढ झालेली अळी कोषावस्थेपूर्वी पानावर रेशमी धाग्यांचा आधारपट्टा व जाळे तयार करते आणि त्याला स्वतःला चिकटवून घेते. कोषाचा रंग लालसर तपकिरी असून त्यावर बारीक काळे टिपके असतात. त्याची लांबी सुमारे १.५ ते १.२.५ मि.मी. असते.
- ग्रीड (फुलपाखरू) : नराच्या पंखांचा वरचा भाग लालसर ते नारिंगी असून, कडावर गडद तपकिरी रंगाची पट्टी दिसते. मादीचा रंग तुलनेने फिकट तांबूस-तपकिरी असतो. नर आणि मादी दोघांच्याही पंखांचा खालचा

किडीच्या संपूर्ण अवस्थांची ओळख



अंडी अवस्था.



अळी अवस्था (शेवटची इनस्टार).



कोष अवस्था.



ग्रीड (फुलपाखरू) : पंख मिटलेल्या अवस्थेत.



ग्रीड (फुलपाखरू) : पंखांची वरील बाजू.

सूक्ष्मदर्शकाखालील अळीचे वर्णन




बाजूने दिसणारी अळी.



डोके (Head).



वक्षवरील (Thorax) केसाळ शंक्वाकार उंचवटे.



उडर (Abdomen).

अळीमुळे होणारे नुकसान



पानावरील नुकसान.



फळावरील नुकसान. (सर्व छायाचित्रे : रवींद्र पालकर)

जीवनक्रम

अंड्यातून ३ ते ४ दिवसांत अळी बाहेर येते. अळीच्या पाचही अवस्थांचा मिळून कालावधी १८ ते २५ दिवसांचा असतो. त्यानंतर एक दिवसाची पूर्वकोष अवस्था येते, तर कोष अवस्था ८ ते ९ दिवसांची असते. ग्रीड अवस्थेचा

कालावधी उपलब्ध साहित्यात स्पष्ट नाही. हा जीवनक्रम इतर यजमान वनस्पतीवर नोंदवला गेला असून बोरावरील संपूर्ण जीवनक्रमाची नोंद अद्याप उपलब्ध नाही.

अळी नुकसान कशी करते?

अळी यजमान वनस्पतीची कोवळी पाने, कळ्या, फुले आणि पक्व फळे खाते. त्यामुळे कोवळ्या पानांवर कुरतडल्याच्या खुणा, कळ्या व फुलांचे नुकसान आणि फळांच्या पृष्ठभागावर खाल्ल्यामुळे पडलेले खोल्यात खडे दिसून येतात. परिणामी अकाली फळमळ होण्याची शक्यता असते.

विवेचनाविषयी : बोर पिकावर ही अळी नव्याने आढळून आली असून, तिच्या प्रभावी व्यवस्थापनाबाबत अद्याप पुरेसे संशोधन उपलब्ध नाही. त्यामुळे सध्या विशिष्ट नियंत्रण उपायांची शिफारस करता येत नाही.

- रवींद्र पालकर,

८८८८४०६५२२

(पीएच. डी. स्कॉलर, कीटकशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)