




कोळीची अंडी अवस्था.



कोळीची पिलावस्था.



प्रीड अवस्था : मादी कोळी.



प्रीड अवस्था : नर कोळी.

छायाचित्रांद्वारे पीक संरक्षण



रवींद्र पालकर डॉ. अमयकुमार बागडे डॉ. उत्तम कदम

वांग्यावरील लाल कोळीची समस्या

सूक्ष्मदर्शकाखालील ओळख

- अंडी : अंडी अतिसूक्ष्म, गोलाकार, पारदर्शक ते फिकट पांढरट असतात. मादी कोळी पानांच्या खालच्या बाजूस तयार केलेल्या जाळ्यात अंडी घालते. फलित मादी जीवनकाळात सरासरी ५९, तर अफलित मादी सरासरी २२ अंडी घालते.
- अंडी अवस्था : अंडी सुमारे ०.२ ते ०.३ मि.मी. आकाराची असून रंग फिकट हिरवा, पिवळसर हिरवा किंवा पारदर्शक असतो. या अवस्थेत शरीरावर केवळ तीन जोड्या पाय असतात.
- पिलावस्था : ही अवस्था प्रोटोनिम्फ व ड्युटोनिम्फ अशा दोन टप्प्यांत पूर्ण होते. यात चार जोड्या पाय विकसित होतात. शरीर हिरवट ते तपकिरी असून दोन्ही बाजूंना एकेक गडद ठिपका स्पष्ट दिसतो.
- प्रीड कीड : प्रीड कोळी ०.४ ते ०.६ मि.मी. लांब, अंडाकृती व सूक्ष्म असून रंग फिकट हिरवा, पिवळसर हिरवा किंवा तपकिरी असतो. दोन्ही बाजूंना एकेक ठळक काळा ठिपका असल्याने

त्यास 'दोन ठिपक्यांचा कोळी' (Two-spotted spider mite) असे म्हणतात. शरीरावर सूक्ष्म केस, तर मुखांग पेदक-शोषक असतात. मादी मोठी व गोलसर, तर नर लहान, अरंद व मागील बाजूस टोकदार असतो. हिरवाव्यात मादीचा रंग नारिंगी-लाल होतो.

जीवनक्रम

मादी कोळी पानांच्या खालच्या बाजूस तयार केलेल्या जाळ्यात अंडी घालते. वांग्यावर अंड्याचा कालावधी सुमारे २.५ दिवसांचा असतो. अंड्यातून निघालेली अंडी १ ते २ दिवसांत कात टाकून प्रोटोनिम्फ अवस्थेत जाते. प्रोटोनिम्फ व ड्युटोनिम्फ या अवस्था प्रत्येकी १ ते ३ दिवस टिकतात. प्रत्येक सक्रिय अवस्थेनंतर कोळी निष्क्रिय राहून कात टाकतो. या कात टाकण्याच्या अवस्थेना अनुक्रमे निम्फोक्रायसलिस, ड्युटोक्रायसलिस व टेलिओक्रायसलिस म्हणतात. अंडी ते प्रीड हा जीवनक्रम ९ ते १५ दिवसांत पूर्ण होतो. नर लवकर, तर मादी थोडी उशिरा प्रीड होते. प्रीड कोळी १० ते १२ दिवस जगतो. उष्ण हवामानात हा कालावधी कमी होऊन पिढ्या झपाट्याने वाढतात.

नियंत्रण

- पानांच्या खालच्या बाजूस कोळी व जाळी नियमित तपासावी.
- प्रादुर्भावग्रस्त पाने काढून नष्ट करावीत. नवयुक्त खतांचा अनावश्यक वापर टाळावा.
- वांधावरील व शेतातील तण काढावे.
- शेतातील पहाक कोळ्यांचे (नियोसियुलस इ.) संवर्धन करावे.
- प्रति पान ८ ते १० कोळी आढळल्यास कोळीनाशकाची फवारणी करावी.


शिफारशीत कोळीनाशके

कोळीनाशक	प्रमाण प्रती लिटर पाणी	प्रतीक्षा कालावधी
सायनोपायरफेन (३० टक्के एस.सी.)	०.६ मि.लि.	१० दिवस
इटीक्सझोल (१० टक्के एस.सी.)	१.० मि.लि.	५ दिवस
फेनाझाक्विन (१० टक्के ई.सी.)	२.५ मि.लि.	७ दिवस
हेक्सिथायाझॉक्स (५.४ टक्के ई.सी.)	१.० मि.लि.	७ दिवस
आयसोसायप्रोक्सेरम (१.२ टक्के डी.सी.)	०.४ मि.लि.	५ दिवस
प्रोपारपाइट (५७ टक्के ई.सी.)	२.५ मि.लि.	६ दिवस
पायरीडाबेन (२० टक्के डब्ल्यू.पी.)	१.० ग्रॅम	३ दिवस
स्पायरोमेसिफेन (२२.९० टक्के एस.सी.)	०.८ मि.लि.	५ दिवस
इटीक्सझोल (६ टक्के) अधिक अबामेक्विन (१.५ टक्के एस.सी.) (संयुक्त कोळीनाशक)	०.९ मि.लि.	५ दिवस
प्रोपारपाइट (४२ टक्के) अधिक हेक्सिथायाझॉक्स (२ टक्के ई.सी.) (संयुक्त कोळीनाशक)	२.५ मि.लि.	७ दिवस

(टीप : सर्व कोळीनाशकांना लेबल बरेच आहे.)

दोन ठिपक्यांचा (लाल) कोळी ही वांग्यावरील एक सातत्याने आढळणारी गंभीर समस्या आहे. पानांच्या खालच्या बाजूस राहून रस शोषणारा हा सूक्ष्म कोळी उष्ण व कोरड्या हवामानात झपाट्याने वाढतो आणि उत्पादनात सुमारे १६ ते ३९ टक्क्यांपर्यंत घट घडवून आणतो. आजच्या लेखात आपण या किडीच्या विविध अवस्थांची छायाचित्रांसह ओळख आणि तिच्या नियंत्रणाविषयीची माहिती घेणार आहोत.

- सामान्य नाव : लाल कोळी, दोन ठिपक्यांचा कोळी
- शास्त्रीय नाव : टेटरनायकस अर्टिकी (Tetranychus urticae)
- वर्ग (Class) : अरॅकिनिडा (Arachnida)
- गण : ट्रॉम्बिडोफॉर्मिस (Trombidiformes)
- कुल : टेटरनायकिडी (Tetranychidae)
- नुकसानकारक अवस्था : पिले व प्रीड अवस्था
- यजमान पिके : हा अत्यंत बहुपक्षी कोळी असून वांगी, टोमॅटो, सोयाबीन, भेंडी, भुरईगा, काकडी, पोपळा, स्ट्रबेरी, द्राक्ष, तसेच गुलाब, जर्बेरा व कार्नेशन या फुलपिकांवर उपजीविका करतो.




कोळ्यामुळे तयार झालेले जाळे.

नुकसानीचे स्वरूप

पिले व प्रीड कोळी पानांच्या खालच्या बाजूस राहून पेशीरस शोषतात. सुरुवातीस पानांच्या वरच्या बाजूस सूक्ष्म पिवळसर-पांढरट ठिपके दिसतात. प्रादुर्भाव वाढल्यास पाने पिवळी, कांस्यवर्णी व निस्तेज होतात, कडेने बाकडी होतात किंवा विद्रूप होतात. पुढे ती करपून बाळतात व अकाली गळतात. तीव्र प्रादुर्भावात पानांच्या खालच्या बाजूस, कधी फळांवरही रेशमी जाळी दिसते. पणक्षेत्र घटल्याने प्रकाशसंश्लेषण कमी होते, झाडांची वाढ खुंटते आणि फळांचा आकार व दर्जा घटतो. वांती उत्पादनात सुमारे १६ ते ३९ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. उष्ण व कोरड्या हवामानात प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढतो.



पानांच्या कडा वरच्या बाजूला बळतात. (वरील बाजू)



पानांचा द्रोणाकार आकार (कपिंग लक्षणे) : बाजूचे दृश्य

- रवींद्र पालकर, ८८८८४०६५२२ (पीएच. डी. स्कॉलर, कीटकशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)

- कीटनाशकांच्या शिफारशी लेबल बरेच असल्याने किंवा जॉइंट अ‍ॅग्रीस्कॉप्रास आहेत.
- फवारणीचे प्रमाण हाय वॉल्यूम फवारणी पंपासाठीचे आहे.
- खरेदीवेळी पक्के बिल घ्यावे.
- बॅन किंवा 'रेस्ट्रिक्टेड' आहे का पाहावे.
- लेबल बरेच वाचावेत.
- पुरेशा ज्ञानाशिवाय रसायने एकमेकांत मिसळू नयेत.
- रसायनांचा गट तपासावा.
- पीएचआय, एमआरएल तपासावेत.
- पेरणी वा लागवडीपूर्वी संबंधित बियाणांवर कोणती बीजप्रक्रिया केलेली आहे, हे तपासूनच पुढील बीजप्रक्रिया करावी.

- मधमाशी, मित्रकीटकांना हानिकारक कीटनाशकांचा वापर टाळावा.
- पीक फुललेला अवस्था लक्षात घेऊन कीटनाशकांचा समजूस वापर करावा.