



रवींद्र पालकर

द्राक्षावरील थ्रिप्स : महत्त्वाची समस्या

द्राक्षावरील फुलकिड्याची, अर्बात थ्रिप्सची ओळख हो कीड कोवळी पाने व द्राक्षामुळेचे नुकसान करतो. छाटणीनंतरचे २० ते ५० दिवस म्हणजे कोवळी फुट ते फुलोरा आणि मणी वाटण्याएवढे होईपर्यंतचा काळ या किडीसाठी निर्णायक असतो. त्यामुळे सुस्वातोग्यासुच नियमित निरीक्षण करून वेळेस नियंत्रणाचे आण्य करावेत.

■ शास्त्रीय नाव : स्किटोट्रिप्स डॉर्सॉलिस (Scirtothrips dorsalis)

■ प्रजाती - भारतात द्राक्ष पिकावर स्किटोट्रिप्स डॉर्सॉलिस, रिपिकोट्रिप्स झुएट्टिस, थ्रिप्स हवाईन्सिस आणि थ्रिप्स पाल्मो या चार प्रजातींची नोंद करण्यात आली आहे.

■ नुकसानकारक अवस्था - अळ्या (पिल्ले) व ग्रीड.

■ यजमान पिके - हो बहुपक्षी कीड असून द्राक्ष, मिरची, आंबा, कापूस, पुष्पगुला, वांगी, टोमॅटो, कांदा, स्ट्रबेरी, डाळिंब, पपई, चहा, तंबाखू, सोयाबीन, कडधान्ये, गुलाब व अन्य फुलझाडे अशा संपूर्णाने अधिक बनस्पतीवर उपजीविका करते.


किडीची उपस्थिती, लक्षणे कशी ओळखावी?

थ्रिप्स (फुलकिडे) अतिशय

फुलकिडीच्या सूक्ष्मदर्शकाखाली दिसणाऱ्या विविध अवस्था



अळी अवस्था (पहिली इनस्टा)



दुसरी इनस्टा (अळी अवस्था)



ग्रीड अवस्था

सूक्ष्म असल्याने ते सहज उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. त्यासाठी काळा पुड्या वा पांढरा कागद घ्यावा. कोवळ्या फुटीवर हलका आघात करून त्यावर अळ्या व ग्रीड संकलित करावेत.

सूक्ष्मदर्शकाखालील ओळख

अळी अवस्था

मादी एकेक करून अळी कोवळ्या पानांच्या उतीत, देठात किंवा फुले-यात पूर्णपणे गाडते. त्यामुळे ती उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. अळी सुमारे ०.२५ मि.मी. लांब, मृजपिंडाच्या आकाराची आणि चकचकीत पांढरी असतात.

पिंगातून पाहिल्यास पानावर लहानसा पारदर्शक उदाव दिसतो. ती अळ्याची जागा असते. अळी बाहेर पडल्यावर तिचे सूक्ष्म छिद्र उघडे आणि पोवतीची उती तपकिरी होते.

अळी अवस्था

अळीला पंख नसतात. शरीर लांबट असते. पहिल्या टप्प्यातील अळी सुमारे ०.३ मि.मी. लांब असते. ती सुस्वातोग्या पारदर्शक असते आणि काही तासांत फिकट पिवळी होते. दुसऱ्या टप्प्यातील अळी सुमारे ०.५ मि.मी. लांब, नारिंगी-पिवळी आणि मधल्या भागात रंग, पिंगासारखी दिसते. मरणात किडीच्या या अवस्थेला पिलावस्था म्हटले जाते

असले तरी इंग्रजी शास्त्रीय भाषेत लार्वा (larva) किंवा अळी म्हणतात.

कोष अवस्था

दुसरी अळी अवस्था संपली की अळी खाणे थांबवते. त्यानंतर पानांच्या बागलेत, गुंडाळलेल्या पानांत, पालपाचोळ्यात किंवा जमिनीच्या वरच्या थरात कोषावस्थेत जाते. पूर्वकोषाचे शरीर पिवळसर असते, पंखांच्या कळ्या आबुड आणि स्पर्शक लहान व बाजूला चढलेले असतात. कोष अधिक गडद पिवळा असतो, पंखांच्या कळ्या पोटाच्या शेवटजवळ पोहोचलेल्या असतात आणि स्पर्शक डोब्यामागे

चढलेले असतात.

ग्रीड अवस्था

ग्रीड नारिंगी-पिवळसर ते फिकट पिवळा असतो. डोके व पांथ फिकट तर बहुतांशी गडद असतात. पंखांच्या दोन जोड्या किंचित गडद छटेच्या असून, त्यांच्या कडांवर केसांच्या झालरी असतात. पोटाच्या दुसऱ्या ते सातव्या खंडावर मध्यभागी मागे निघुळते होत जाणारे त्रिकोणी फिकट तपकिरी ठिपके असतात. डोब्यावर तीन साधे डोळे त्रिकोणी रचनेत असतात. नाडी सुमारे ०.९ ते १.२ मि.मी. लांब असते. नर लहान (सुमारे ०.७ मि.मी.) आणि क्वचित आढळतो, कारण शेतात बहुतांश प्रजनन नरांशिवाय होते.

प्रजातीची

खात्रीशीर ओळख

सुक्ष्मदर्शकाखाली तज्ज्ञाकडूनच प्रजातीची खात्रीशीर ओळख होते. यासाठी स्पर्शक आठ खंडाचे असतात; पहिले दोन फिकट आणि तिसऱ्यापासून पुढचे गडद. प्रोनेटमवर दाट आडव्या रेषा असतात. मात पुढील कडेल्या मोठे केस नसतात, यामुळे फुलकिडीच्या Frankliniella या प्रजातीपासून फक्त स्पष्ट होते. पुढील पंखांच्या झालरी सरळ असता. पहिली शीर पूर्ण, दुसरी अपूर्ण असते. आठव्या उदरखंडाच्या मार्गाल कडेवर कंगव्यासारखी रचना पूर्ण असत. तर अन्य खंडांच्या बाजूला सूक्ष्म केसांचे पट्टे दिसतात.

जीवनचक्र

मादीने घातलेली अळी ५ ते ८ दिवसांत उबतात. दोन्ही अळी अवस्था मिळून ३ ते ५ दिवसांत पूर्ण होतात. त्यानंतर अळी खाणे थांबवते. कोषावस्थेविषयी माहिती लेखाच्या

फुलकिडीमुळे होणारे नुकसान



ग्रीड पाने खारबडून रस शोषतात.



पानांच्या मार्गाल बाजूस फुलकिड्यांच्या नुकसानीच्या काळसर खुणा.



पानांची टोके वाकडी होतात.



पानांचा प्रोणाकार आकार.



फळांवर किडीने खारबडल्याची चिन्हे.

वरिल भागात दिलेली आहेच. पूर्वकोष अवस्था अर्ध्या ते दीड दिवसांची तर कोषावस्था ३ ते ५ दिवसांची असते. कोषातून पंखांशी ग्रीड बाहेर पडतो. ग्रीड मादी ३ ते ७ दिवस जाते. नर क्वचितच आढळतात आणि बहुतेक प्रजनन नरांशिवाय होते. तापमान वाढल्यास जीवनचक्र लवकर पूर्ण होते. अंड्यापासून ग्रीडापर्यंत संपूर्ण जीवनचक्र साधारणतः १२ ते १५ दिवसांत पूर्ण होते.

नुकसानीचे स्वरूप

फुलकिड्याच्या अळ्या व

ग्रीड अणकुचीदार मुखांगाने उती खारबडून रस शोषतात. त्यामुळे पेशी फुटून मरतात. हिरवी उती आधी चंदेरी, नंतर तपकिरी किंवा काळसर होते. पानांवर चंदेरी-पांढरे ठिपके उमटतात आणि ते दुर्गंधी ओळखू येतात. पानांची टोके वाकडी होतात, पाने सुकूततात आणि प्रादुर्भाव वाढल्यास विद्रूप होऊन वाळतात व गळतात. त्यानंतर किडे नवीन पाने, कोवळी फुट आणि देठांकडे चढतात. फुले-यात फुले गळतात फळण्याकमी होते आणि उपादान घटते. मणी वाटण्याएवढे असताना त्यांवर

सूक्ष्म खुणा उमटतात. पडतात. गोटीएवढे झाल्यावर तपकिरी होऊन एकमेकांत मिसळतात. मणी मोठे होताना साल कॉर्कसारखी जाड होऊन भेगा पडतात. खवले असलेले घड बाजारात कमी दराने विकले जातात.


रवींद्र पालकर

८८८४०५५२२

(पोएच. डी. स्कॉलर,

कीटकशास्त्र विभाग, महात्मा फुले

कृषी विद्यापीठ, राहुरी)



ग्रीड



नुकतीच घातलेली अळी.



अळी अवस्था.

फुलकिडीचे नियंत्रण

- किडीची आगमनाचे नष्ट करण्यासाठी बागेत नवचन्ना ठेवावी. बागेत व बागेबाहेर पंथांची यक्षपत तणांची अनावश्यक वाड होऊ देऊ नये.
- एप्रिल छाटणीनंतर जमिनीची खोल नांगट करण्यास किडीच्या सुप्त अवस्था व कोष नष्ट

होतात.

- छाटणीनंतरचे २० ते ५० दिवस म्हणजे कोवळी फुट ते फुलोरा आणि मणी वाटण्याएवढे होईपर्यंतचा काळ निर्णायक असतो. या काळात आठवड्यातून एकदा पिंगाने निरीक्षण करावे.
- निरीक्षणासाठी निळे विकट साम्ये वेलेल्या पर्णसंभाराजवळ योग्य उंचीवर लावावेत.

एकरा ४ ते ५ सापळे पुरेसे ठरतात.

- बागेतील ग्रीन लेसविंगसारख्या मिर कीटकांचे संवर्धन करावे.
- किडीच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने जारी केलेल्या अनेकशा पाचमणोल कीटकनाशकांचा शिफारशीनुसार तसेच पोएचआय व एमआएल नुसार वापर करावा.



शासन प्रमाणित

बायोस्टिम्युलंट्स

