





जीवनक्रम



फिकट पिवळ्या रंगाची नवजात पिलावस्था.



दुसऱ्या इनस्टार अवस्थेतील केशरी रंगाची पिलावस्था.



किडीची प्रौढ अवस्था.

(छायाचित्रे : रवींद्र पालकर)



छायाचित्रांद्वारे पीक संरक्षण

रवींद्र पालकर

झेंडूवरील 'निओहायडॅटोथ्रिप्स' फुलकीड

कीड अशी नुकसान करते



पानांवर फिकट ओरखडे व काळ्या विष्ठेचे सूक्ष्म थेंब.



किडीने खरडून खाल्ल्यामुळे पानाच्या पृष्ठभागावर निर्माण झालेले चांदीसारखे चमकदार पट्टे.

नुकसानीचे स्वरूप

या किडीची पिले व प्रौढ अवस्था प्रामुख्याने कोवळ्या पानांवर तसेच पानांच्या देठाच्या कडेला (Leaf axils) खरडून, त्यातून बाहेर पडणारा रस शोषतात. या प्रक्रियेमुळे पानांवर डाग पडतात. पानांचा रंग फिकट होतो किंवा त्यावर चकाकदार (चांदीसारखे) पट्टे दिसू लागतात. पानांवर फिकट रंगाचे ओरखडे, रेषा व पानांचा वाकडेपणा दिसून येतो. याशिवाय पानांच्या पृष्ठभागावर किडीच्या काळ्या रंगाच्या विष्ठेचे सूक्ष्म थेंबही स्पष्टपणे दिसून येतात. सततच्या रस शोषणामुळे पिकाची एकूण शारीरिक वाढ खुंटते, झाडे अशक्त व कमकुवत बनतात. परिणामी कळ्या व फुलांची संख्या कमी होते, फुलांची गुणवत्ता खालावते. अंतिमतः एकूण उत्पादनात लक्षणीय घट होते.

महाराष्ट्रासह देशातील महत्वाचे फुलपीक असलेल्या झेंडू या पिकावर सर्वसाधारणपणे फुलकीडीच्या (थ्रिप्स) फ्रॅक्लिनिप्ला ऑक्सिडॅन्टॅलिस, स्किटोथ्रिप्स डॉन्टॅलिस, थ्रिप्स टॅबॅसी, इ. प्रजातींचा प्रादुर्भाव आढळतो. मात्र या वर्षी झेंडू पिकावर निओहायडॅटोथ्रिप्स समायंजक याही फुलकीडीचा प्रादुर्भाव निदर्शनास आला आहे. या किडीचे नमुने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले परिसरात आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात मिळाले. जागतिक स्तरावर या फुलकीडीची प्रथम नोंद १९९९ मध्ये ब्राझील येथे झेंडू पिकावर आढळते. भारतात मात्र २००३ या वर्षी प्रकाशित एका संशोधनामध्ये ती सहा राज्यांमध्ये आढळल्याचे नमूद केले आहे. ही फुलकीड प्रथमदर्शनी मिरची पिकावरील ब्लॅक थ्रिप्स (शा. नाव : थ्रिप्स पार्विस्मिनुस) या प्रजातीसारखीच भासते. ही कीड पानांवर खरडून रसशोषण करते. परिणामी, पानांवर स्पेरी किंवा फिकट रंगाचे ओरखडे, रेषा, पानांचा वाकडेपणा दिसून येतो. कालांतराने पीक अशक्त बनते, वाढ खुंटते व एकूण उत्पादनात लक्षणीय घट होते. आजच्या लेखात या नव्याने आढळून आलेल्या फुलकीडीची ओळख व तिच्या नुकसानीचे स्वरूप छायाचित्रांच्या माध्यमातून सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत.

- सामान्य नाव : फ्रेंच झेंडूवरील थ्रिप्स (French marigold thrips)
- शास्त्रीय नाव : निओहायडॅटोथ्रिप्स समायंजक (Neohydatothrips samayankur)
- यज्ञमान पिके : प्रामुख्याने फ्रेंच झेंडूवर आढळते.
- दुय्यम यज्ञमान पिके : राजगिरा, लसूण, केळ (पानकोबीचा प्रकार), बटाटा, पायरेथ्रम फूल, पालक, रताळे, टोमॅटो.

किडीची ओळख

- पिलावस्था : या किडीची पिलावस्था आकाराने अतिशय लहान, फिकट पिवळ्या ते केशरी रंगाची असते. डोके गुळगुळीत असून त्यावर कोणतेही तपकिरी डाग आढळत नाहीत. शृंगिकांची लांबी डोक्याच्या लांबीपेक्षा किंचित जास्त म्हणजेच सुमारे १ ते १.२ पट असते. या अवस्थेत किडीस पंख नसतात; मात्र इतर सर्व अवयव प्रौढांसारखेच पण आकाराने लहान असतात. शरीराच्या वरच्या बाजूस लहान, रुंद व चपटे काट्यासारखे केस (सेटी) असून त्यावर सूक्ष्म काटे आढळतात.
- कोष अवस्था (प्री-प्युपा व प्युपा) : या अवस्थेत कीड अन्नग्रहण करत नाही. प्री-प्युपा अवस्थेत अळीपेक्षा स्पष्ट वेगळेपणा दिसून येतो; शरीरावर लहान पंखांच्या कळ्या (wing buds) दिसू लागतात. पुढील प्युपा अवस्थेत या पंखांच्या कळ्या अधिक लांब झालेल्या असतात व शृंगिका मागील बाजूस वाकलेल्या दिसतात.

जीवनक्रमनिहाय ओळख खुणा

- प्रौढ अवस्था : प्रौढ किडीचे शरीर ठळकपणे द्विरंगी असून मुख्यतः तपकिरी रंगाचे असते. या किडीस आठ खंडांची शृंगिका (Antennae) असते. पंख पूर्णपणे विकसित झालेले असून ते पोटापेक्षा किंचित लांब असतात. पुढील पंखांवर गडद व फिकट रंगाचे आडवे पट्टे स्पष्टपणे दिसून येतात.
- पिलावस्था : या अवस्थेत छातीचा पुढील भाग (Pronotum) जवळजवळ पूर्णपणे बारीक दाणेदार (granulate) रचनेचा दिसून येतो. मधल्या छातीच्या भागावर (Mesonotum) तपकिरी रंगाच्या ठिपक्यांची एक जोडी स्पष्टपणे आढळते. मागील छातीच्या भागावर (Metanotum) तपकिरी ठिपक्यांच्या दोन जोड्या दिसून येतात; यापैकी पुढील

व्यवस्थापन

- उन्हाळ्यात खोल नांगरणी करून जमिनीत लपलेल्या किडीच्या विविध अवस्थांचा नाश करावा.
- लागवडीसाठी केवळ कीडमुक्त, निरोगी व सशक्त रोपांचीच निवड करावी.
- रोपे शक्यतो संरक्षित नेट हाउसमध्ये किंवा जाळीदार संरक्षित तयार करावीत.
- पिकाची फेरपालट करताना झेंडू किंवा इतर यज्ञमान नसलेल्या पिकांची निवड करावी.
- पिकाची अतिदाट लागवड टाळावी.
- पिकामध्ये आंतरपीक म्हणून मका किंवा ज्वारी यांचा समावेश करूयास किडीचा प्रादुर्भाव कमी राहतो.
- शेती व बांधावरील बापूळ, रानवागे, रामतुळस इ. पर्यायी यज्ञमान तणांचा वेळोवेळी नायनाट करावा.

- पिकास नययुक्त खतांची अतिरिक्त मात्रा टाळावी. संतुलित खत व्यवस्थापन करावे.
- पिकाच्या पानांच्या उंचीवर निळ्या रंगाच्या चिकट सापळ्यांचा सर्वेक्षणासाठी वापर करावा.
- शेतातील उपयुक्त भिखरीटकांचे संवर्धन करावे.
- प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कडुनिंबयुक्त कीटकनाशकांची फवारणी उपयुक्त ठरू शकेल. (टीप : उपलब्ध संशोधन साहित्याच्या अभ्यासातून या प्रजातीच्या फूल किडीच्या व्यवस्थापनावर अद्याप कुठेही शास्त्रीय संशोधन झालेले दिसत नाही. त्यामुळे लेखात दिलेले मराठातीय, यांत्रिक व जैविक उपाय हे अन्य फूल किडीच्या व्यवस्थापनाच्या आधारे व केवळ माहितीसाठी दिले आहे. तथापि त्यांना अधिकृत शिफारशी म्हणता येणार नाही.)

जीवनक्रम

या किडीचे जीवनचक्र अंडी, पिलावस्था, पूर्वकोषावस्था व कोषावस्था अशा क्रमाने पूर्ण होते. मादी कीड पानांच्या उततीमध्ये अंडी घालते. अंड्यातून बाहेर पडलेली पिले सक्रियपणे अन्न ग्रहण करीत वाढतात. वाढीच्या काळात पिले कात टाकून दोन इनस्टार अवस्था पूर्ण करतात. त्यानंतर पूर्वकोषावस्थेत प्रवेश करतात. पूर्वकोषावस्थेनंतर कीड कोषावस्थेत जाते. ही कोषावस्था प्रामुख्याने जमिनीत पूर्ण होते. कोषावस्थेतून पूर्ण वाढलेली प्रौढ कीड बाहेर पडते. या किडीचे संपूर्ण जीवनचक्र साधारणतः १५ ते ३० दिवसांत पूर्ण होते. अनुकूल परिस्थितीत वर्षभरात या किडीच्या अनेक पिढ्या विकसित होतात. (या किडीच्या जीवनचक्रातील विविध अवस्थांचा अचूक कालावधी संशोधन साहित्यात स्पष्टपणे उपलब्ध नाही.)

- रवींद्र पालकर ८८८८४०६५२२३
(पीएच. डी. स्कॉलर, कीटकशास्त्र विभाग, महात्मा
मुळे कृषी विद्यापीठ, रायगड)