



उन्हाळी भुईमुगातील एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

रवींद्र पालकर, डॉ. अभयकुमार बागडे

खरीप हंगामापेक्षा रब्बी व उन्हाळी हंगामामध्ये भुईमुगाचे उत्पादन जास्त मिळते. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात अनेक ठिकाणी भुईमुगाची पेरणी झाली आहे. सध्या उन्हाळी भुईमुग पीक काही ठिकाणी वाढीच्या अवस्थेत ते फुलेला अवस्थेत आहे. सद्यःस्थितीमध्ये उन्हाळी भुईमुग पिकावर मावा, फुलकिडे, तुडतुडे या रसशोषक किडी, तर पाने पोखरणारी अळी व केसाळ अळी या पतंगवर्गीय किडींचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. खरीप हंगामापेक्षा किडींचा प्रादुर्भाव कमी असला तरी दर्जेदार उत्पादनासाठी किडींचे वेळीच एकात्मिक व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.



पांढऱ्या रंगाचा ठिपका असतो. अळी पाठीमागच्या बाजूस निमुळती व हिक्ट तपकिरी रंगाची, डोके व छातीचा भाग गडद असतो.

- अंड्यातून बाहेर आलेली अळी सुरुवातीला पान पोखरते. त्यामुळे पानांवर वेड्यावाकड्या रेषा दिसून येतात. मोठी अळी एकाच पानाच्या दोन कडा गुंडाळून पान खाते. ते पान उघडून पाहिल्यास त्यात अळी किंवा कोप सहज दिसतो.
- जास्त प्रादुर्भाव झाल्यास पूर्ण पीक करपल्यासारखे दिसते.
- आर्थिक नुकसान पातळी : ५ प्रादुर्भावप्रस्त पाने प्रति झाड (लागवडीनंतर ३० दिवसांनी)

केसाळ अळी

- पतंगाचे पुढचे पंख पांढरे असतात. समोरच्या बाजूने आणि डोक्यावर पिवळसर रेषा असते. मागील पंख काळ्या चिन्हासह पांढरे असतात.
- अळीच्या शरीरावर लांब, लालसर तपकिरी केस असतात. दोन्ही टोकांना काळ्या रंगाची पट्टी असते.
- अळी सुरुवातीला कोवळ्या पानांच्या खालील पृष्ठभागा खरवडून खाते. त्यानंतर झाडाच्या पानांवर आणि मुख्य देठावर हल्ला चढविते.
- आर्थिक नुकसान पातळी : ८ अंडींपुंज प्रति मीटर

एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

- भुईमुग लागवड केलेल्या शेताच्या चारी बाजूला चवळी व सोयाबीन या सापळा पिकांची लागवड करावी. जेणेकरून किडी त्याकाडे आकर्षित होऊन मुख्य पीक सुरक्षित राहील.
- मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी प्रत्येक १० ओळींनंतर एक ओळ चवळी पिकाची सापळा पीक म्हणून लागवड करावी. जेणेकरून रसशोषक किडी व ढाल किड्यासारखे मित्रकीटक सापळा पिकाकडे आकर्षित होतील.
- मका पिकाची आंतरपीक म्हणून लागवड केल्यास फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.
- पीक लागवडीनंतर ४० दिवसांपर्यंत शेत तणविरहित ठेवावे.
- नत्रयुक्त खतांचा शिफारशीप्रमाणे वापर करावा.
- केसाळ अळीची अंडी व अळी अवस्था वेचून नष्ट करावी.
- तुडतुडे व मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी

रसशोषक किडी

मावा

- लहान पिले सुरुवातीला फिककट हिरव्या रंगाची असतात. नंतर गडद हिरव्या रंगाची होत जातात. प्रौढ मावा कीड अंडाकृती पंखी आणि तपकिरी किंवा मोरपंखी रंगाचे तर बिगर पंखी गर्द तपकिरी मोरपंखी किंवा काळ्या रंगाचे असतात.
- पिले व प्रौढ पानांच्या खालील बाजूस राहून रस शोषतात. त्यामुळे पिकाची वाढ खुंटते. रसशोषण करतांना कीड विष्टेद्वारे गोड मधुसारख्या चिकट द्रव स्रवते. त्यावर काळ्या बुरशीची वाढ होते. परिणामी, प्रकाशासंश्लेषण प्रक्रिया मंदावते. पाने चिकट व काळी पडतात.
- मावा कीड भुईमुगावरील स्ट्रुप विषाणू, पर्णगुच्छ आणि भुईमुगावरील रोझेट विषाणू या विषाणूजन्य रोगांचा प्रसार करते. आर्थिक नुकसान पातळी : ५ ते १० मावा प्रति शेंडा (सुरुवातीच्या अवस्थेत)



फुलकिडे

- रंगाने फिककट पिवळसर असून आकाराने अतिशय लहान म्हणजेच १ मि.मी. इतके असतात.
- कोवळ्या शेंड्यावर व पानांवर आढळतात.
- लहान पिले व प्रौढ पानांवर खरवडून त्यातील अन्नरसाचे शोषण करतात. त्यामुळे पानांवर सुरुवातीला पांढुरके चट्टे व नंतर चमकदार तपकिरी ठिपके दिसून येतात.
- फुलकिडे हे शेंडेमर (बड नेक्रोसिस) या विषाणूजन्य रोगाचा प्रसार करतात. आर्थिक नुकसान पातळी : ५ फुलकिडे प्रति शेंडा (घडी केलेल्या पानांमध्ये)



तुडतुडे

- हिरवे, पाचरीच्या आकाराचे आणि तिरकस चालीवरून पटकन ओळखता येतात.
- पिले व प्रौढ पानांच्या खालच्या बाजूस राहून अन्नरस शोषण करतात. त्यामुळे पानाच्या कडा वरील बाजूस वळतात. पाने पिवळी पडून करपल्यासारखी दिसतात.
- आर्थिक नुकसान पातळी : ५ ते १० तुडतुडे प्रति झाड (पीक उगवणीनंतर ३० दिवस), त्यानंतर १५ ते २० तुडतुडे प्रति झाड.

रासायनिक नियंत्रण

किडीने आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडल्यानंतर मित्र कीटकांचे संवर्धन लक्षात घेऊन रासायनिक फवारणीचे नियोजन करावे.

किडीचे नाव	कीटकनाशक	प्रमाण (प्रति लिटर पाणी)
पाने पोखरणारी अळी, फुलकिडे, तुडतुडे	आयसोसायक्लोसेरम (१.२ टक्के डीसी)	१ मिलि
पाने पोखरणारी अळी	मेथाक्सिफेनोझाइड (२१.८ टक्के ईसी)	०.२४ मिलि
तुडतुडे	थायामेथोक्झाम (१२.६० टक्के) अधिक लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन (१.५० टक्के झेडसी) (संयुक्त)	०.३ मिलि
मावा	क्लोरोपायरीफॉस (२० टक्के ईसी)	२ मिलि
पाने पोखरणारी अळी	डेल्टामेथ्रिन (२.८० टक्के ईसी)	१.२५ मिलि
मावा, तुडतुडे	इमिडाक्लोप्रिड (१७.८ टक्के एसएल)	०.२ मिलि
फुलकिडे, तुडतुडे, पाने पोखरणारी अळी	लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन (०.५ टक्का ईसी)	०.५ मिलि
तुडतुडे, फुलकिडे	क्विनॉलफॉस (२५ टक्के ईसी)	२.८ मि.ली

(लेबलकलेम आहेत.)

- हेक्टर २५ ते ३० पिवळे चिकट सापळे तर फुलकिडीच्या नियंत्रणासाठी एकरी १० ते १२ मिळे चिकट सापळे लावावेत.
- नागअळीच्या सर्वेक्षणाकरिता एकरी १० ते १२ कामगंध सापळे उभारावेत.
- पतंगवर्गीय किडीच्या नियंत्रणासाठी हेक्टर पाच प्रकाश सापळे लावावेत. शेतात पक्षिधांबे उभारावेत.
- नागअळीच्या नियंत्रणासाठी, प्रौढ ट्रायकोग्रामा चिलोनि ५०,००० किंवा प्रौढ टेलोनोमस रेमस ५०,००० प्रति हेक्टर प्रमाणे यासारखे परजीवी कीटक दोन वेळा ७ ते १० दिवसांच्या अंतराने

- सोडावात.
- प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून, निंबोळी अर्क ५ टक्के किंवा अझाडिऑक्टिन (३०० पीपीएम) २ ते ३ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणे फवारणी घ्यावी.
- रवींद्र पालकर, ८८८८४०६५२२ (आचार्य पदवी विद्यार्थी, कीटकशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)
- डॉ. अभयकुमार बागडे, ९४२३२९७०२७ (सहायक प्राध्यापक, कीटकशास्त्र विभाग, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषी महाविद्यालय, कोल्हापूर)

सोव्या जाइशती

कृषि विज्ञान केंद्र, अहमदाबाद

२०२४-२५

१. २०२४-२५

२. २०२४-२५

३. २०२४-२५

४. २०२४-२५

५. २०२४-२५

बी - बियाणे

जलसिंचन

बियाणे / गोपे विक्री

बोआवेल्स

हळद बियाणे विक्री, हळद हळद उत्पादन क्षमता असलेले विविध जातीचे हळदीचे बणे उपलब्ध

१) चंद्रमंथन-ओल्या हळदीमध्ये अत्युच्च उत्पादन क्षमता व उत्कृष्ट कर्कसुमिन % चे परसेंट व असणारी जात २) LAKADONG मध्यावस्थेचे कर्कसुमिन % साठी जगप्रसिद्ध असणारे LAKA DONG या गावाच्या जवळच उत्पादित झालेले आणि ते पुनः मागवने हळद हळद बियाणे विक्रीसाठी उपलब्ध. 95032 10270, 9561330128.amitt raders6999@gmail.com

नामांकित भूजल संशोधक २३ वर्षांच्या अनुभवासह शास्त्रीय व अत्याधुनिक यंत्रणे जोडून, जूनी विहीर, विहीरीची जागा, खोली, खड्याची माहिती. श्रीगद कन्सल्टन्सी ९४०२५१७४९४

पाटील अंग्रेजी इंजिनियर्स पुणे नवीन विहीर, बोआवेल्ससाठी हीन मशिनद्वारे भू-जल संशोधन. मोबाईल : ९८५०३७४१३३

जमीनविषयक

जमीन खरीदी

हळद बियाणे विक्री, फक्त सहा महिन्यांचे तयार होणारी हळदीची जात १) प्रगती- ACC 48 म्यासेस रिचर्स सेटर कोर्झ कोर्टेकट यांच्याद्वारे क्लॉनल सिलेक्शनद्वारे संशोधित आणि प्रसारीत जात २) वायगाव- भारत सर्वप्रथम आपल्या गुण वैशिष्ट्याद्वारे भौगोलिक मानांकन प्राप्त करणारी (GI TAG) व आपल्या उच्च कर्कसुमिन % साठी प्रसिद्ध सातव महिन्यात येणारी हळद. 9503210270, 9561330128.amitt raders 6999@gmail.com

नोकरीविषयक

नोकरी देणे

जनावर संभारक्यास शेत-कन्यास मदतीसाठी नवरा बायको जोडणे हवे आहे. रहाण्याची व खाण्याची सोय, तसेच आकर्षक पगार, संपर्क : ९८६०६०१२००, ९८९०९६२९४.

जाहिरातीसाठी संपर्क

● पुणे - संपर्क - ९९४४०६५३६ ● सातारा - संपर्क - ९९४४०६५३६

● सांगली - संपर्क - ९८८९११२१३ ● नाशिक - संपर्क - ९९६६६९९९८

● उ. सांगली - संपर्क - ९८८९११२१६ ● अहमदाबाद - संपर्क - ९९४४०६५३६

● नागपूर - संपर्क - ८८८८८८६०० ● अकोला - संपर्क - ९९४४०६५३६

● अजमेर - संपर्क - ९९६०४९९९९६ ● सोलापूर - संपर्क - ९९४४०६५३६

अग्रवाल, सकाळ मिडिया प्रा. लि. ५४५, बुधवार पेठ, पुणे ४११००२
फोन: ०२०-२४४०५४४४ Email: agrosakalevents@esakal.com