

# ऑँकटोबर महिन्यातील कामांचा तपशील

## बागायती कापूस

- \* पिकातील २० ते ३० टके बोंडे फुटल्यानंतर पहिली वेचणी करून घ्यावी. त्यानंतर १५ ते २० दिवसांच्या अंतराने अनुक्रमे दुसरी व तिसरी वेचणी करावी.
- \* कापूस वेचणी आटोपल्यानंतर सर्व पन्हाठ्या उपटून शेताबाहेर न्याव्यात व त्याचा कंपेस्ट खत तयार करण्यासाठी वापर करावा. जेणेकरून किंडीच्या अवस्था नष्ट होतील.

## ऊस

- \* आडसाळी ऊसाच्या लागणीस को.८६०३२ या जातीसाठी शिफारशीत (५००:२००:२०० किलो नन्हा, स्फुरद व पालाश प्रति हेक्टरी) खतमात्रेच्या १० टक्के नन्हा ५० किलो प्रति हेक्टरी खताची तिसरी मात्रा (१२ ते १६ आठवडे वयाच्या ऊसासाठी) देण्यासाठी युरिया ११० किलो प्रति हेक्टरी खताची वापरावा व इतर जातीच्या ऊसाकरीता प्रति हेक्टरी ४० किलो नन्हा खतांचा तिसरा हम्सा (८७ किलो युरिया) लागणीनंतर १२ ते १६ आठवड्यांनी घ्यावा. नन्हा खताची मात्रा देण्यासाठी निमकोटेड युरियाचा वापर करावा.

- \* आडसाळी ऊसाच्या लागणीस ६० दिवसांनी प्रतिहेक्टरी ५ लिटर मल्टीमॅक्रोन्युट्रीयंट (नन्हा ८%, स्फुरद ८% व पालाश ८%) व मल्टीमायक्रोन्युट्रीयंट (ग्रेड-२) या द्रवरूप खतांची प्रत्येकी ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी ऊसाच्या लागणीस ९० दिवस झाले असल्यास प्रतिहेक्टरी ७.५ लिटर मल्टीमॅक्रोन्युट्रीयंट व मल्टीमायक्रोन्युट्रीयंटची प्रत्येकी ७५० लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.

- \* आडसाळी ऊसाला असेटोबैक्टर जिवाणु संवर्धकाची बिजप्रक्रिया लागणीचे वेळी केलेली नसल्यास ६० दिवसांनी १ लिटर द्रवरूप असेटोबैक्टर जिवाणु संवर्धकाची २०० लिटर पाण्यात मिसळून हेक्टरी फवारणी करावी.

- \* पूर्वहंगामी ऊसाच्या लागवडीसाठी पूर्वतयारी करा, पूर्वहंगामी ऊसाची लागण १५ ऑँकटोबर ते १५ नोव्हेंबर या कालावधीत पूर्ण करा.

- \* लागणीसाठी को.८६०३२, को.एम. ०२६५, फुले १०००१, को.ही.एस.आय.९८०५ आणि ही.एस.आय.४३४ या जारीची निवड करा

- \* लागणीच्या वेळी प्रति हेक्टरी ४० किलो नन्हा (८७ किलो युरिया) को.८६०३२ जातीसाठी व इतर सर्व जारीसाठी ३४ किलो नन्हा (७४ किलो युरिया) तसेच ८५ किलो स्फुरद (५३१ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट) आणि ८५ किलो पालाश (१४२ किलो म्युरेट ऑफ पोटेश) ही रासायनिक खते सरीमध्ये घ्यावीत.

- \* लागणीपूर्वी बेण्यास ३०० मिली. मॅलॉथिअॅन अथवा २६५ मिली डायमेथोएट व १०० ग्रॅम बावीस्टीन १०० लिटर पाण्यात मिसळून तयार केलेल्या द्रावणात बेणे १० मिनीटे बुडवुन बेणे प्रक्रिया करावी. या बिजप्रक्रियेनंतर प्रति हेक्टरी १० किलो असेटोबैक्टर अथवा १ लिटर द्रवरूप असेटोबैक्टर व स्फुरद विरघविणारे जीवाणु १.२५ किलो १०० लिटर पाण्यात मिसळून तयार केलेल्या द्रावणात कांडया ३० मिनीटे बुडवाव्यात.

- \* पाणी बचतीच्या दृष्टीने मध्यम जमिनीसाठी ७५-१५० सें.मी. पट्टा पद्धतीचा वापर करावा यासाठी ७५ सें.मी. अंतराच्या जोड ओळीनंतर एक ओळ रिकामी सोडावी सलग पद्धतीने लागवडीसाठी हलक्या जमिनीत ९०

सें.मी., मध्यम जमिनीत १०० सें.मी. तर भारी जमिनीत ध्ये १२० सें.मी. दोन सन्यातील अंतर ठेवावे. पाण्याच्या अधिक बचतीसाठी ठिक्क सिंचनाचा वापर करावा.

- \* लागणीनंतर वापस येताच हेक्टरी ५ किलो ऑँट्रोटाप किंवा मेट्रीब्यूझीन १.५ किलो प्रति १००० लिटर पाण्यात मिसळून जमिनीवर फवारावे. जमीन तुडवली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- \* पूर्वहंगामी उसात आंतरापिक म्हणून बटाटा, पानकोबी, फुलकोबी, वाटाणा, कांदा व लसून, यासारख्या भाजीपाला पिकांचा समावेश करावा.
- \* लोकरी मावाग्रस्त ऊसावर मित्रकीटक असल्यास रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर करू नये. लोकरी माव्यासाठी डिफा ऑफिडीन्हरा, मायक्रोमेस यासारख्या मित्र किटकांचे संवर्धन करावे. तसेच ऊसासाठी शिफारशीत रासायनिक खतांचा संतुलीत वापर करावा व ऊस पिकास जास्त पाणी देवू नये.

## हरभरा व्यवस्थापन

- \* २० ऑँकटोबर ते १० नोव्हेंबर पर्यंत बागायती हरभरा बीजप्रक्रिया करून पेरावा.
- \* पेरणीनंतर लगेच पुरेसा ओलावा असताना उगवणीपूर्व तणनाशक पेंडिमेथॉलीन फवारावे.
- \* किडनियंत्रणासाठी एकात्मिक किड नियंत्रण पद्धतीचा अवलंब करावा. यामध्ये सापळा पीक, कामगंध सापळे, पक्षी थांबे याचा अवलंब करावा.

## तूर

- \* पिकाच्या शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत किडी पासून संरक्षणासाठी हेलिकोकिल (५०० मिली / ५०० लि. पाणी ) या जैविक किटकनाशकाची दुसरी फवारणी करावी व आवश्यकता असेल तर तिसरी फवारणी १८.५ % एस सी क्लोरअन्ट्रीनिलोप्रोल १५० मिली अथवा इमामेक्टीन झोएट ५०% एस. जी. २०० ग्रॅम अथवा फल्युबेंडामाईड ४५ % एस. सी. १५० मिली/ ५०० लि. पाणी या किटकनाशकाची करावी.
- \* शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत पाऊस नसल्यास पिकास संरक्षित पाणी दयावे किंवा २ टक्के युरियाची फवारणी करावी.

## नाचणी पीक

- \* नाचणी पीक पावसाच्या पाण्यावर घेतले जाते. पावसामध्ये खंड पडल्यास उपलब्धतेनुसार संरक्षित पाणी घ्यावे.
- \* भेसळ काढणे.

## रब्बी जवारी

- \* **पहिला पंधरवडा** – पेरणीनंतर १५ दिवसांनी विरळणी करून एका ठिकाणी एक रोप ठेवावे व पेरणीनंतर ३ आठवड्यांने फटीच्या कोळप्याने पहिली कोळपणी करावी.
- \* **दुसरा पंधरवडा** – खोडकिडा नियंत्रण- खोडकिडा प्रादुर्भाव दिसल्यास क्युनालफॉस २५ ईसी ७५० मीली प्रवाही ५०० लीटर पाणी प्रती हेक्टरी फवारणी करावी. आवश्यकतेनुसार पहिली खुरपणी करावी. पेरणीनंतर ५ आठवड्यांने पासेच्या कोळप्याने दुसरी कोळपणी करावी. आणि गरज असल्यास पहिले संरक्षित पाणी घ्यावे.

## गहू

- \* गह्यासाठी भारी व खोल जमीन निवळून पूर्व मशागत करणे.
- \* बागायती पेरणीसाठी फुले समाधान, तपोवन, त्र्यंबक, गोदावरी या जातीमधून हेक्टरसाठी १२० किलो बियाणे घेणे.
- \* जिरायती पेरणीसाठी पंचवटी किंवा नेत्रावती या वाणाचे हेक्टरी १०० किलो बियाणे घेणे.

## फळबाग व्यवस्थापन

- \* **डाळिंब** – पक्व फळांची काढणी करणे व बाग ताणावर सोडावी.
- \* **सिताफळ** – गरज असल्यास पाणी व्यवस्थापन करून पिकलेली फळे काढावीत.
- \* **बोर** – गरज असल्यास पाणी व रोग किंडीचे नियंत्रण करावे.
- \* **आवळा** – पक्व झालेली फळे काढण्यात सुरवात करावी.
- \* **अंजीर** – खताचे नियोजन करणे व मिठा बहार धरणेसाठी पाण्याचे नियोजन करावे.
- \* **जांभूळ** – बाग ताणावर सोडावी.
- \* **कागदी लिंबू** – हस्त बहाराचे नियोजनासाठी १ टक्का पोटेशियम नायट्रेटची फवारणी करावी.
- \* **रस शोषणारा पतंग** : गंधं सापळ्याचा वापर करावा (२०० मिली क्लोरोपोपायरीफॉस + १ किलो गुळ + १ लि. मोसंबीचा रस + १० लि. पाणी मिसळून त्यामधून प्रत्येकी ५०० मिली द्रावण घेऊन हेक्टरी १५-२० सापळे लावावे.)
- \* **कँकर / खैच्या रोग** : स्ट्रेटोसायक्लीन १ ग्रॅम + कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ३० ग्रॅम प्रति १० लि. पाणी
- \* **डिंक्या रोग** : खोडावर जमिनीपासून ४५ ते ६० अंतरावर बोर्डेपेस्ट लावावी.

## भाजीपाला व्यवस्थापन

- \* रांगडा कांदा लागवड पहिल्या आठवड्यात पूर्ण करावी.
- \* खरीप कांदा लागवडीस नन्हा खताचा दुसरा हम्सा घ्यावा.
- \* खरीप हंगामातील वांगी, मिरची, टोमेंटो काढणी करावी.
- \* कोबी व फ्लॉवर पिकाची काढणी करावी.
- \* वेलर्गाय भाजीपाला पिकाची काढणी करावी.
- \* भेंडी व गवार पिकाची काढणी करावी.
- \* सर्व खरीप भाजीपाला पिकांवरील किड व रोगाचे नियंत्रणाचे उपाय करावेत.
- \* दुसऱ्या पंधरवड्यापासून लसून लागवडीस सुरवात करावी.
- \* रबी हंगामातील कांदा पिकासाठी रोपवाटीका तयार करावी.
- \* कांदा बियाण्याची पेरणी करावी.
- \* रबी हंगामातील टोमेंटो, फ्लॉवर, कोबी पिकाची रोपवाटीका करावी.

\* वाटाणा पिकाची लागवड दुसऱ्या पंधरवड्यापासून करावी.

\* रबी हंगामामध्ये येण्याच्या गाजर, मुळा, बिट पिकाची लागवड करावी.

- ## पशुसंवर्धन
- \* या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात आंतरकूमी व बाब्य पौरोपजीवींचा नायनाट करण्यासाठी बहुप्रभावी जंतनाशक औषध पशुवैद्यकाच्या सहाय्याने द्यावे.
  - \* उर्जा व प्रथितेयुक्त पशु आहाराचा समावेश करून पशु आहार वाढवावा.
  - \* थंडीची सुखवात होवून श्वसनाचे आजार संभावण्याची शक्यता असते त्यामुळे विशेषत: लहान वासरांची काळजी घ्यावी.

## कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी नवीन उपक्रम

- १) **भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना :** या योजनेअंतर्गत एकूण १६ बहूर्वजीवी फळपिकांचा समावेश करण्यात आला असून नारळ, सिताफळ व