



# हवामान आधारीत कृषि सल्ला

## ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

(५९) हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. २१/०९/२०२१

जिल्हा : अहमदनगर

मागील आठवड्यातील हवामान (१४/०९/२०२१ ते २०/०९/२०२१)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज (२२/०९/२०२१ ते २६/०९/२०२१)				
१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	दिनांक	२२	२३	२४	२५	२६
१.८	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	पाऊस (मिमी)	२४	२२	१२	१२	९
२९.८	२८.४	२९.६	२९.२	३१.०	२७.६	३२.४	कमाल तापमान (अं.से.)	३२	३१	३२	३२	३१
२३.७	२४.३	२३.४	२१.९	२२.४	२४.१	२४.९	किमान तापमान (अं.से.)	२३	२२	२३	२२	२२
२.०	२.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	ढग स्थिती (आकाश)	७	७	७	७	८
८५.०	८१.०	८०.०	८६.०	८३.०	८२.०	८०.०	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८९	९०	९१	९२	९१
६७.०	५९.०	५७.०	५३.०	७३.०	५२.०	८९.०	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५९	६३	६५	६५	६२
५.१	५.१	३.८	३.६	३.०	२.४	०.६	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	२४	२२	१२	१२	९

### हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		पुढील पाच दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. पुढील पाच दिवस काही ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		१) शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून दिल्यास काम पण योग्य होइल आणि योग्य सामाजिक अंतरही ठेवले जाईल . शेती यंत्रे निर्जंतुकीकरण करावीत . तोंडाला मास्क अथवा कापड गुडाळावे. २) पिकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी. ३) हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला व हवामानचा पूर्वानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा..
संदेश		मका: अमेरिकन लष्करी अळीच्या नियंत्रणाकरिता थायमेथोक्झाम १२.६% + लॅमडा सायहेलोथ्रीन ९.५% झेड सी या मिश्र कीटकनाशकाची ०.५ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी
मका	दाणे चिकात असताना	अमेरिकन लष्करी अळीच्या नियंत्रणाकरिता थायमेथोक्झाम १२.६% + लॅ मडा सायहेलोथ्रीन ९.५% झेड सी या मिश्र कीटकनाशकाची ०.५ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. किंवा क्लोरांट्रानिलीप्रोल १८.५% एस सी या कीटकनाशकाची ०.४ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. फवारणी करिताना औषध पानावर अथवा इतरत्र न फवारता पोंग्यामध्येच पडेल याची दक्षता घ्यावी जेणे करून औषधाचा परिणाम योग्य दिसेल.
सोयाबीन	शेंगा भरण्याची अवस्था	चक्री भुंग्याच्या नियंत्रणाकरिता थायक्लोप्रीड २९.७ एस सी १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
कपाशी	बोंड धरणे	बोड अळीच्या नियंत्रणाकरिता लॅम्बडा-सायहालोथ्रीन ५% प्रवाही ८ मिली किंवा स्पिनोसॅड ४५ एस सी ३.५ मिली किंवा प्रोफेनोफोस ५० ईसी ३० मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब १५.८ ईसी १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
तूर	फांद्या फुटण्याची अवस्था	तूर पिकावर खोड माशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास ५ टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी करावी. तूर पिकात वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येताच अशी रोगग्रस्त झाडे उपटून नष्ट करावीत. या रोगाचा प्रसार कोळी या कितकामार्फत होतो. कोळी नियंत्रणासाठी रासायनिक औषधाची फवारणी करावी.
भुईमुग		वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकाची काढणी करून घ्यावी.
बाजरी		वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकाची काढणी करून घ्यावी.
मिरची		मिरची वरील चुरडा-मुरडा [लिफ कर्ल] हा विषाणूजन्य रोग आहे. या रोगाचा प्रसार फुलकिडे , कोळी या रस शोषून किडीमार्फत होतो. फुलकिड्यांच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ५ एस.सी. १५ मिली. आणि कोळीच्या नियंत्रणासाठी फेनक्झाकिन १० ईसी. २५ मिली. प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारावे.
काकडी		काकडी पिकावर रस शोषणार्या किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास त्यासाठी इमिडॅक्लोप्रिड १७.८ एसएल ४ मिली किंवा थायोमेथोक्झाम २५ डब्ल्यू जी ४ ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारावे. वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांवर ढगाळ वातावरणामुळे केवडा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास त्यासाठी मेटॅलॅक्झिल एम.झेड.-७२ , २५ ग्रॅम किंवा कॉपरऑक्झिक्लोराईड २५ ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यातून १० दिवसांच्या अंतराने साध्या हात पंपाने फवारावे.
कांदा		कांदा या पिकावर फुलकिडे व करपा आढळून आल्यास लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन ५ ईसी. ६ मिली. + टेब्युकोनेझोल १० मिली + स्टिकर १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारणी करावी.



# हवामान आधारीत कृषि सल्ला ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

वांगी	वांगी पिकावर शेडे व फळ पोखरणारी अळीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी एकात्मिक कीड नियंत्रण करावे. किडग्रस्त शेडे दर आठवड्यातून खुडून टाकावे आणि नष्ट करावेत. तोडणीनंतर किडग्रस्त फळे गोळा करून जमिनीत गाडून टाकावीत. तसेच अळीचे नियंत्रणासाठी सायपरमेथ्रीन १०% प्रवाही १० मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब १४.५ ईसी. १० मिली किंवा स्पानोसेड ४५ ईसी ५ मिली किंवा क्लोरेन्टनीलीप्रोल १८.५ एससी ३ मिली प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारावे. अधून-मधून ५ टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.
टोमॅटो	रस शोषणार्या किडीच्या नियंत्रणाकरिता इमिडाक्लोप्रीड ५ मिली किंवा थायोमोक्झाम ४ ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारणी करावी. फळ पोखरणारी अळीच्या नियंत्रणाकरिता सायपरमेथ्रीन १० ईसी १० मिली + ट्रायझोफॉस ३५% ईसी [संयुक्त किटकनाशक] २० मिली + टेब्युकोनॅझोल १० मिली प्रति १० लीटर पाण्यातून साध्या हात पंपाने फवारणी करावी. अधून-मधून ५% निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.

स्त्रोत :

१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

२) मागील हवामान : भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशाळा पाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, मफुकृवि , राहुरी

ठिकाण : मफुकृवि , राहुरी.

दि. : २१/०९/२०२१

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकमौसे, ऐएमएफयु, राहुरीतथा  
प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.