



हवामान आधारित कृषि सल्ला
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी,
कृषि विद्या विभाग, मफुकुवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

३८) हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. १०.०७.२०२६

जिल्हा : धुळे

मागील आठवड्यातील हवामान (०३/०६/२०२६ ते ०९/०७/२०२६)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज (११/०७/२०२६ ते १५/०७/२०२६)				
०३	०४	०५	०६	०७	०८	०९	< दिनांक >	११	१२	१३	१४	१५
							पाऊस (मिमी)	३	२	०	२	०
							कमाल तापमान (अंसे)	३३	३३	३४	३४	३४
							किमान तापमान (अंसे)	२४	२४	२४	२५	२५
							ढग स्थिती (आकाश)	७	६	८	६	६
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८१	७८	७७	७७	७७
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५५	५३	५६	५०	५४
							वाऱ्याचा वेग (किमी/ तास)	२१	२४	२७	२६	२४

हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार, पुढील पाच दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच दि. ११, १२ व १४ जुलै रोजी काही ठिकाणी अतिशय हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		विजेचा पुर्वानुमान मिळणेकरीता दामिनी मोबाईल अपचा वापर करावा. हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला व हवामानचा पुर्वानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल अपचा वापर करावा.
संदेश		पेरणी योग्य पाऊस झालेल्या ठिकाणी वापसा आल्यानंतर राहिलेल्या पेरण्या पूर्ण करून घ्याव्यात.
कापूस	पेरणी	पेरणी योग्य पाऊस झाला असल्यास वापसा आल्यानंतर पेरणीकरीता खालील वाणांना प्राधान्य द्यावे आणि बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. वाणांची निवड: फुले अनमोल, फुले शुभ्रा, फुले माही, फुले चेतना, फुले धारा व प्रचलीत बीटी कपाशीचे वाण बीजप्रक्रिया: अप्रमाणित बियाण्यास कार्बोक्झिन ३७.५% + थायरम ३७.५% डब्ल्यू एस बुरशीनाशकाची प्रक्रिया प्रति किलो बियाण्यास ३.५ ग्रॅम या प्रमाणात करावी. त्यामुळे मुळकुज, जीवाणूजन्य करपा यांसारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.
सोयाबीन	पेरणी	पेरणी योग्य पाऊस झाला असल्यास वापसा आल्यानंतर पेरणीकरीता खालील वाणांना प्राधान्य द्यावे आणि बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. वाणांची निवड: फुले दूर्वा, फुले संगम, फुले अग्रणी, फुले किमया, फुले कल्याणी, जेएस ३३५, जेएस ९३०५ बीजप्रक्रिया: जमिनीतून प्रसार होणाऱ्या रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रति किलो बियाण्यास कार्बोक्झिन ३७.५%+थायरम ३७.५% डी.एस. ३० ग्रॅम प्रति १० किलो बियाण्यास चोळावे त्यानंतर अॅझोक्सिस्ट्रोबीन २.५% + थायोफिनेट मिथाईल ११.२५% + थायोमिथोक्झाम २५% एफ.एस. १०० मिली किंवा थायोमिथोक्झाम ३०% एफ.एस. १०० मिली प्रति १० किलो बियाण्यास बीजप्रक्रिया करावी त्यामुळे खोड माशी पासून रोपावस्थेत पिकाचे संरक्षण होईल.
तूर	पेरणी	पेरणी योग्य पाऊस झाला असल्यास वापसा आल्यानंतर पेरणीकरीता खालील वाणांना प्राधान्य द्यावे आणि बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. वाणांची निवड: फुले राजेश्वरी, गोदावरी, भिमा, बीडीएन ७११, बीडीएन ७१६, फुले तृप्ती बीजप्रक्रिया: पेरणीपूर्वी प्रतिकिलो बियाण्यास ५ ग्रॅम ड्रायकोडर्मा किंवा ४ ग्रॅम कार्बोक्झिन ३७.५% + थायरम ३७.५% डब्ल्यू.एस. या संयुक्त बुरशीनाशकाची बीजप्रक्रिया करावी. यानंतर प्रत्येकी २५० ग्रॅम रायझोबियम व पी.एस.बी. जिवाणु संवर्धन १० किलो बियाण्यास गुळाच्या थंड द्रावणातून चोळावे.
मका	पेरणी	पेरणी योग्य पाऊस झाला असल्यास वापसा आल्यानंतर पेरणीकरीता खालील वाणांना प्राधान्य द्यावे आणि बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. वाणांची निवड: राजर्षी, फुले महर्षी, आरभ बीजप्रक्रिया: पेरणीपूर्वी २ ते २.५ ग्रॅम थायरम हे बुरशीनाशक प्रति किलो बियाण्यास चोळावे. तसेच अझोटोबक्टर जीवाणु संवर्धन २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास चोळून नंतर पेरणी करावी.



हवामान आधारित कृषि सल्ला ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

सूर्यफूल	पेरणी	पेरणी योग्य पाऊस झाला असल्यास वापसा आल्यानंतर पेरणीकरीता खालील वाणांना प्राधान्य द्यावे आणि बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. वाणांची निवड: फुले भास्कर, फुले रवीराज बीज प्रक्रिया: केवडा रोग टाळण्यासाठी ६ ग्रॅम मेटॅलॅक्झिल ३५ डब्ल्यू. एस. प्रति किलो बियाण्यास चोळावे. विषाणूजन्य (नॅक्रॉसिस) रोगाच्या प्रतिबंधासाठी थायामिथोक्झाम ३०% एफ.एस.१० मिली प्रति किलो बियाण्यास लावावे. त्यानंतर अँझोटोबॅक्टर हे जीवाणू खत २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास पेरणीपूर्वी लावावे.
बाजरी	पेरणी	पेरणी योग्य पाऊस झाला असल्यास वापसा आल्यानंतर पेरणीकरीता खालील वाणांना प्राधान्य द्यावे आणि बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. वाणांची निवड: धनशक्ती, फुले महाशक्ती, फुले आदिशक्ती, फुले मुक्ताई, एबीएच १२६९ बीज प्रक्रिया: बीजप्रक्रिया केलेले प्रमाणित बियाणे उपलब्ध नसल्यास पेरणीपूर्वी बियाण्यास २० टक्के मिठाच्या द्रावणाची प्रक्रिया करावी. त्यासाठी १० लिटर पाण्यात २ किलो मिठ विरघळावे. पाण्यावर तरंगणारे बुरशीयुक्त हलके बियाणे बाजुला काढून त्याचा नाश करावा व तळाला असलेले निरोगी आणि वजनाने जड असलेले बियाणे वेगळे करून पाण्याने २ ते ३ वेळा धुवावे त्यानंतर सावलीत वाळवून पेरणीसाठी वापरावे
भुईमुग	पेरणी	पेरणी योग्य पाऊस झाला असल्यास वापसा आल्यानंतर पेरणीकरीता खालील वाणांना प्राधान्य द्यावे आणि बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करावी. वाणांची निवड: फुले उन्नती, फुले भारती, फुले उनप, टीएजी २४, फुले मोरणा, फुले वारणा बीजप्रक्रिया: बियाण्यापासून प्रादुर्भाव होणाऱ्या व रोपावस्थेत येणाऱ्या रोगापासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २.५ ग्रॅम मॅन्कोझेब किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा जैविक बुरशीनाशक चोळावे. नंतर एक किलो बियाण्यास २५ ग्रॅम रायझोबीयम आणि २५ ग्रॅम स्फुरद विरघळणारे जीवाणू संवर्धक (घनरूप किंवा द्रवरूप) चोळावे बीजप्रक्रिया केलेले बियाणे सावलीत सुकवून पेरावे.

स्त्रोत :
१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.
२) मागील हवामान :

ठिकाण : मफुकृवि, राहुरी.
दि. : १०.०७.२०२६

स्वाक्षरीत
प्रमुख अन्वेषक, ग्राकूमसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा
प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.