



# हवामान आधारित कृषि सल्ला ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

१००) हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. १३.०२.२०२६

जिल्हा : धुळे

| मागील आठवड्यातील हवामान<br>(०६/०२/२०२६ ते १२/०२/२०२६) |    |    |    |    |    |    | हवामान घटक                   | पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज<br>(१४/०२/२०२६ ते १८/०२/२०२६) |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| ०६                                                    | ०७ | ०८ | ०९ | १० | ११ | १२ | दिनांक                       | १४                                                            | १५ | १६ | १७ | १८ |
|                                                       |    |    |    |    |    |    | पाऊस (मिमी)                  | ०                                                             | ०  | ०  | ०  | ०  |
|                                                       |    |    |    |    |    |    | कमाल तापमान (अंसे)           | ३४                                                            | ३४ | ३३ | ३१ | ३० |
|                                                       |    |    |    |    |    |    | किमान तापमान (अंसे)          | १८                                                            | १८ | १९ | १७ | १६ |
|                                                       |    |    |    |    |    |    | ढग स्थिती (आकाश)             | २                                                             | २  | १  | ०  | १  |
|                                                       |    |    |    |    |    |    | सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)  | ६९                                                            | ६५ | ६२ | ६० | ५४ |
|                                                       |    |    |    |    |    |    | दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५४                                                            | ५२ | ४९ | ४९ | ५० |
|                                                       |    |    |    |    |    |    | वाऱ्याचा वेग (किमी/ तास)     | २                                                             | ४  | ३  | १  | ५  |

## हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला

| पीक            | अवस्था                | कृषि विषयक सल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हवामान सारांश  |                       | प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सामान्य सल्ला  |                       | १) हवामान अंदाज आधारित कृषि सल्ला व हवामानचा पूर्वानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा.<br>२) शेतकरी बंधूंनी पिकावर किटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना स्वतः ची योग्य ती खबरदारी/ काळजी घ्यावी तसेच फवारणी करिता किसान कवच बॉडीसूटचा वापर करावा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| संदेश          |                       | उन्हाळी भुईमूग पिकाची पेरणी १५ फेब्रुवारी पूर्वी पूर्ण करून घ्यावी. पेरणीचे वेळी रात्रीचे किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उन्हाळी भुईमूग | पेरणी                 | <b>बियाणे:</b> भुईमूगाचे वाणनिहाय बियाणे प्रति हेक्टर खालीलप्रमाणे वापरावे.<br>१०० किलो : फुले चैतन्य (केडीजी-१६०), फुले धनी (जे. एल. १०८५)<br>१२० ते १२५ किलो : फुले उन्नती, फुले भारती, फुले वारणा, फुले मोरणा<br><b>बीजप्रक्रीया:</b> बियाण्यापासून प्रादुर्भाव होणाऱ्या व रोपावस्थेत येणाऱ्या रोगापासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २.५ ग्रॅम मॅन्कोझेब किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा जैविक बुरशीनाशक चोळावे. नंतर एक किलो बियाण्यास २५ ग्रॅम रायझोबीयम आणि २५ ग्रॅम स्फुरद विरघळणारे जीवाणू संवर्धक (घनरूप किंवा द्रवरूप) चोळावे बीजप्रक्रीया केलेले बियाणेसावलीत सुकवून पेरावे.<br><b>पेरणी अंतर:</b> दोन ओळीतील अंतर ३० सें.मी. व दोन रोपातील अंतर १० सें.मी. ठेवावे.<br><b>पेरणी:</b> उन्हाळी हंगामात जमीन ओलवून नंतर वापशावर पाभरीने अथवा टोकण पद्धतीने पेरणी करावी. टोकण पद्धतीने पेरणी केल्यास बियाणे कमी लागून उगवण चांगली होते.                                                                                          |
| हरभरा          | घाटे सुटण्याची अवस्था | <b>मर रोगाचे नियंत्रण</b><br>हरभरा मर रोगाचे यशस्वी नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. एकदा झाल्यानंतर मर रोग पूर्णपणे बरा होत नाही. त्यामुळे वेळीच रोगग्रस्त झाडांचे निर्मूलन, योग्य पाणी व्यवस्थापन व जैविक रासायनिक उपायांचा समन्वय केल्यास रोगाचा प्रसार रोखता येतो आणि उत्पादनात होणारे मोठे आर्थिक नुकसान निश्चितच टाळता येऊ शकते.<br>रोगग्रस्त व अर्धवट वाळलेली झाडे मुळासकट उपटून शेताबाहेर नष्ट करावीत.<br>शेतात पाणी साचू देऊ नये. गरजेनुसार हलके पाणी द्यावे.<br>ट्रायकोडर्मा व्हिरिडी किंवा ट्रायकोडर्मा हार्झियानम २.५ ते ५ किलो प्रति हेक्टर या प्रमाणे शेणखतात मिसळून ओळींमध्ये द्यावे.<br>ओळींमध्ये नीमकेकचा २५० ते ५०० किलो प्रति हेक्टर प्रमाणात वापर करावा.<br>शेणखत व सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवून जमिनीतील उपयुक्त सूक्ष्मजीवांचे संतुलन सुधारावे.<br>चांगला निचरा असलेली जमीन निवडून नत्र खताचा अतिरेक टाळावा.<br>हरभऱ्यानंतर पुढील हंगामापूर्वी ज्वारी, बाजरी, मका यांसारखी पिके घेऊन पीक फेरपालट करावी. |
| हरभरा          | घाटे सुटण्याची अवस्था | <b>घाटे आळीच्या नियंत्रणाकरीताचे शिफारशीत किटकांनाशके (प्रमाण प्रति १० लि. पाणी)</b><br>क्लोरोनॅट्रानिलीप्रोल (४७.८५ टक्के एससी) ०.८३ मिलि<br>क्लोरेफेनपायर (२४० ग्रॅम/लि एससी) १६-२० मिलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**हवामान आधारित कृषि सल्ला**  
**ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी,**  
**कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.**



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                      | इमामेक्टीन बेन्झोएट (५ टक्के एसजी) ४.४ ग्रॅम<br>इमामेक्टीन बेन्झोएट (१.९० टक्के ईसी) ७.५ मिलि<br>इंडोक्झाकार्ब (१४.५० टक्के एससी) ८-१० मिलि<br>इंडोक्झाकार्ब (१५.८० टक्के ईसी) ६.६६ मिलि<br>लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन (५ टक्के ईसी) १०-१२ मिलि<br>स्पिनेटोरम (११.७० टक्के एससी) ७.५-९ मिलि<br>क्लोअॅन्ट्रानिलीप्रोल (५.२ टक्के) + नोव्हॅलुरॉन (८.५ टक्के एससी) ८ मिलि<br>फ्लुबेन्डायअमाइड (८.३३ टक्के) + डेल्टामेथ्रीन (५.५६ टक्के एससी) ५ मिलि<br>नोव्हॅलुरॉन (५.२५ टक्के) + इमामेक्टीन बेन्झोएट (०.९ टक्के एससी) १७.५ मिलि<br>नोव्हॅलुरॉन (५.२५ टक्के) + इंडोक्झाकार्ब (४.५० टक्के एससी) १६.५-१७.५ मिलि                                                                                            |
| करडई         |                      | करडई पिकामध्ये घाटे अळीची अंडी किंवा अळी आढळली तर हेलीओकील ५०० मिली ५०० लिटर पाण्यात प्रति हेक्टरवर फवारणी करावी. तसेच घाटे आळीचे कामगंध सापळे हेक्टरी ५ प्रमाणे लावावेत आणि प्रादुर्भाव ओळखावा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मका          | फुलोऱ्याची अवस्था    | अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रण:<br><u>यांत्रिक पद्धती:</u> अंडीपुंज, समुहातील अळ्या वेचून राकेलमिश्रित पाण्यात टाकून नष्ट कराव्यात. सामुहिकरित्या नर पतंग आकर्षित करून मारावेत. अळीचा प्रादुर्भाव लक्षात येण्यासाठी प्रति एकरी चार कामगंध सापळे लावावेत.<br><u>रासायनिक नियंत्रण:</u><br>क्लोअॅन्ट्रानिलीप्रोल १८.५% एस सी ४० जी.ए.आय./ हेक्टर किंवा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५% एस जी ८ ग्रॅम प्रति लि. या प्रमाणात फवारणी करावी. किंवा<br>स्पिनेटोरम ११.७ एस सी ०.५ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. किंवा<br>इमामेक्टीन ५% + बेन्झोएट ल्युफेनुरॉन ४०% डब्ल्यू.जी.०.२ ग्रॅम किंवा नोव्हॅलुरॉन ५.२५% + इमामेक्टीन बेन्झोएट ०.९% एस सी ३ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. |
| गहू          | दाणे भरण्याची अवस्था | गहू पिकास पेरणीनंतर ८० ते ८५ दिवसानंतर दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये वारा शांत असताना पाणी द्यावे जेणेकरून गहू पिक पडणार नाही.<br>गहू पिकावर तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे, प्रादुर्भाव दिसून येताच मॅन्कोझेव ७५% डब्ल्यू पी ३० ग्रॅम १० लिटर पाण्यात किंवा टेब्युकोनेझोल ५०% + टायफ्लोक्झीस्ट्रोबीन २५% डब्ल्यू जी १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| रब्बी ज्वारी | काढणी                | पक्व होत असलेल्या ज्वारी पिकाचे पक्षांपासून संरक्षण करावे. ज्वारीच्या दाण्याच्या टोकाजवळ काळा ठिपका दिसून आल्यास ज्वारीची काढणी करावी व ८ ते १० दिवस कणसे उन्हात वाळवावीत. तदनंतर पिकाची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सूर्यफुल     | काढणी                | सूर्यफुल पीक सर्वसाधारणपणे ९० ते ९५ दिवसांमध्ये काढणीसाठी परिपक्व होते. पिकाची पाने वाळल्यानंतर काढणी १२ ते १४% ओलावा असताना कणसे विळीने कापून करावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रांगडा कांदा | काढणी                | रांगडा कांद्याची ५० टक्के माना पडल्यानंतर काढणी करावी.<br>सततची पानाची वाढ चालू असल्यास हलकासा ड्रम फिरवावा व त्यानंतर १५ ते २० दिवसांनी कांद्याची काढणी करावी. काढणी नंतर कांदा ४-५ दिवस पातीसहीत शेतात ओळीत सुकवावा.<br>३ ते ४ से.मी. मान ठेवून पात कापावी.<br>कांद्याची प्रतवारी करून कांदा विक्रीसाठी पाठवावा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

स्त्रोत :  
१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.  
२) मागील हवामान :

ठिकाण : मफुकृवि, राहुरी.  
दि. : १३.०२.२०२६

स्वाक्षरीत  
प्रमुख अन्वेषक, ग्राकूमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा  
प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.