



हवामान आधारित कृषि सल्ला
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी,
कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

९६) हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. ३०.०१.२०२६

जिल्हा : धुळे

मागील आठवड्यातील हवामान (२३/०१/२०२६ ते २९/०१/२०२६)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज (३१/०१/२०२६ ते ०४/०२/२०२६)				
२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	दिनांक	३१	०१	०२	०३	०४
							पाऊस (मिमी)	१	०	०	४	१
							कमाल तापमान (अंसे)	२९	३०	३१	३१	३०
							किमान तापमान (अंसे)	१७	१९	१९	१८	१९
							ढग स्थिती (आकाश)	५	५	२	५	२
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६०	५७	५१	५२	५४
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	२७	२५	२२	२२	२२
							वाऱ्याचा वेग (किमी/ तास)	७	४	६	५	८

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार पुढील पाच दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच दि. ३१ जानेवारी रोजी काही ठिकाणी अतिशय हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		१) हवामान अंदाज आधारित कृषी सल्ला व हवामानचा पूर्वानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा. २) शेतकरी बंधूंनी पिकावर किटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना स्वतः ची योग्य ती खबरदारी/ काळजी घ्यावी तसेच फवारणी करिता किसान कवच बॉडीसूटचा वापर करावा.
संदेश		गहू: तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येताच मॅन्कोझेब ७५% डब्ल्यु पी ३० ग्रॅम १० लिटर पाण्यातून किंवा टेब्युकोनॅझोल ५०% + टायफ्लोक्झीस्ट्रोबीन २५% डब्ल्यु जी १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
रब्बी ज्वारी	काढणी	पक्व होत असलेल्या ज्वारी पिकाचे पक्षांपासून संरक्षण करावे. ज्वारीच्या दाण्याच्या टोकाजवळ काळा ठिपका दिसून आल्यास ज्वारीची काढणी करावी व ८ ते १० दिवस कणसे उन्हात वाळवावीत. तदनंतर पिकाची मळणी करून सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
गहू	दाणे भरण्याची अवस्था	गहू पिकास पेरणीनंतर ८० ते ८५ दिवसानंतर दाणे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये वारा शांत असताना पाणी द्यावे जेणेकरून गहू पिक पडणार नाही. गहू पिकावर तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे, प्रादुर्भाव दिसून येताच मॅन्कोझेब ७५% डब्ल्यु पी ३० ग्रॅम १० लिटर पाण्यातून किंवा टेब्युकोनॅझोल ५०% + टायफ्लोक्झीस्ट्रोबीन २५% डब्ल्यु जी १० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
हरभरा	घाटे सुटण्याची अवस्था	घाटेअळीचा प्रादुर्भाव समजण्यासाठी हेक्टर ५ कामगंध सापळे लावावीत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पतंग अडकले जाऊन प्रजननास आळा बसतो. तसेच घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी ५ टक्के निंबोळी अर्क फवारणी करावी. रासायनिक नियंत्रण: इमामेक्टीन बेंझोएट ५% एस जी ४ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाणी किंवा क्लिनॉलफॉस २० मिली प्रति १० लिटर पाणी यापैकी एका रासायनिक किटकनाशकाची करावी.
मका	फुलोर्याची अवस्था	अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रण: यांत्रिक पद्धती: अंडीपुंज, समुहातील अळ्या वेचून राकेलमिश्रित पाण्यात टाकून नष्ट कराव्यात. सामुहिकरित्या नर पतंग आकर्षित करून मारावेत. अळीचा प्रादुर्भाव लक्ष्यात येण्यासाठी प्रति एकरी चार कामगंध सापळे लावावेत. रासायनिक नियंत्रण: क्लोरेट्रिलीप्रोल १८.५% एस सी ४० जी.ए.आय./ हेक्टर किंवा इमामेक्टीन बेंझोएट ५% एस जी ८ ग्रॅम प्रति लि. या प्रमाणात फवारणी करावी. किंवा स्पिनेटोरम ११.७ एस सी ०.५ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. किंवा इमामेक्टीन ५% + बेन्झोएट ल्युफेनुरॉन ४०% डब्ल्यू.जी. ०.२ ग्रॅम किंवा नोव्हालुरॉन ५.२५% + इमामेक्टीन बेंझोएट ०.९% एस सी ३ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.
उन्हाळी	पेरणी पूर्व	जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात पेरणी करता येईल अशा वेताने पेरणीपूर्व ओलीत करावे.



हवामान आधारित कृषि सल्ला
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी,
कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

भुईमुग	तयारी	भुईमुग पिकाचे सुधारित वाण जसे फुले उन्नती, टी.ए.जी.-२४, टी.जी.-२६, टी.पी.जे.-४१, जे.एल.-५०१ खरेदी करावे. उन्हाळी भुईमुगाची पेरणी १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान करावी परंतु तापमान १८ डिग्री सिल्सिअस पर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढत नाही तोवर पेरणी करू नये. उन्हाळी भुईमुग लागवडीसाठी हेक्टरी ५ टन शेणखत/ सेंद्रिय खत जमिनीत मिसळावे.
कांदा	रांगडा	रांगडा कांद्याची ५० टक्के माना पडल्यानंतर काढणी करावी. सततची पानाची वाढ चालू असल्यास हलकासा ड्रम फिरवावा व त्यानंतर १५ ते २० दिवसांनी कांद्याची काढणी करावी. काढणी नंतर कांदा ४-५ दिवस पातीसहीत शेतात ओळीत सुकवावा. ३ ते ४ से.मी. मान ठेवून पात कापावी. कांद्याची प्रतवारी करून कांदा विक्रीसाठी पाठवावा.
कांदा	रब्बी/ उन्हाळी	रब्बी/ उन्हाळी कांद्याच्या लागवडीसाठी सपाट वाफ्यावर लागवड करावी. त्यासाठी वाफे दोन मीटर रुंद व जमिनीच्या उतार प्रमाणे वाफ्याची लांबी तीन ते पाच मीटर ठेवून रान बांधणी करण्यापूर्वी चांगले कुजलेले शेणखत टाकावे. रोपे लागवडी पुर्वी- ५० किलो नत्र, ५० किलो शेणखत व ५० किलो पालाश प्रती हेक्टरी टाळावे. रोपाची लागवड १५ x १० से.मी. अंतरावर करावी.

स्रोत :

१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

२) मागील हवामान :

ठिकाण : मफुकृवि, राहुरी.

दि. : ३०.०१.२०२६

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरी तथा
प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.