



अग्रोमेट अडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. ०८.०७.२०२५

जिल्हा : कोल्हापूर

मागील आठवड्यातील हवामान (०२.०७.२०२५ ते ०८.०७.२०२५)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (०९.०७.२०२५ ते १३.०७.२०२५)				
०२	०३	०४	०५	०६	०७	०८	दिनांक	०९	१०	११	१२	१३
७.४	५.०	१६.४	९.४	६.८	८.८	११.२	पाऊस (मिमी)	२०	१८	१५	१४	१८
२६.२	२६.४	२६.०	२५.२	२७.४	२७.४	२६.८	कमाल तापमान (अं.से.)	२७	२८	२८	२९	३०
२२.४	२१.२	२२.०	२२.२	२२.०	२२.२	२२.४	किमान तापमान (अं.से.)	२३	२३	२३	२४	२४
८	८	८	८	८	८	८	स. दु.	८	८	८	८	७
७	८	७	८	७	७	८	दग स्थिती (आकाश)	८	८	८	८	७
८८	९४	९४	९५	९०	९६	९६	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९३	९२	९१	९४	९५
८४	९३	९५	७९	९१	८३	८३	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८४	८३	८२	८३	८३
४.२	४.७	४.४	४.८	४.०	४.५	५.२	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१३	१२	१२	१२	१३
नै.	प.	नै.	नै.	नै.	नै.	नै.	स. दु.	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.
उ.वा.	वा.	प.वा.	प.वा.	वा.	प.वा.	प.नै.	वाऱ्याची दिशा	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.
मागील आठवड्यातील पाऊस (मिमी)				पाऊस ०१.०१.२०२५ पासून आजपर्यंत (मिमी)				पाऊस दिवस ०१.०१.२०२५ पासून आजपर्यंत				
६५				७४३.१				४४				

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक ९ ते १३ जुलै दरम्यान आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक ९ व १० जुलै रोजी बऱ्याच ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची तर दिनांक ११, १२ व १३ जुलै काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पुढील ५ दिवसांत कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पुढील ५ दिवसांत किमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ९१ ते ९५% या दरम्यान तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ८२ ते ८४% या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी १२ ते १३ किमी या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
विस्तारित श्रेणी अंदाज		विस्तारित श्रेणीच्या अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रामध्ये दिनांक ९ ते १५ जुलै, २०२५ दरम्यान पावसाचे प्रमाण सरासरी दरम्यान तसेच कमाल तापमान सरासरी दरम्यान तर किमान तापमान सरासरी दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
हवामान इशारा		➤ दिनांक ०८.०७.२०२५ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यामधील घाट भागात तुरळक ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. ➤ दिनांक ०९.०७.२०२५ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यामधील घाट भागात तुरळक ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		❖ शेतकरी बांधवांनी हवामान आधारित शेतीविषयक सल्ला आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवर मिळविण्यासाठी गुगल प्ले स्टोरवरून "मेघदूत" अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन तर मेघगर्जना व विजांचा कडकडाट इ.च्या अंदाजासाठी "दामिनी" अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डाउनलोड करावे व त्याचा वापर करावा. ❖ जिल्ह्याच्या मध्य व पूर्व भागातील शेतकरी बांधव जमिनीस वाफसा आल्यानंतर पेरणी करू शकतात ❖ मेघदूत ॲप डाउनलोड करण्यासाठी लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot ❖ दामिनी ॲप डाउनलोड करण्यासाठी लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
संदेश		गोठे स्वच्छ व कोरडे ठेवावेत. साठविलेल्या सुक्या चाऱ्यावर पाणी पडून त्यात बुरशी लागली असेल तर असा चारा जनावरांना देऊ नये तो बुरशी लागलेला चारा नष्ट करावा. जनावरांचे खाद्य / खाद्यघटक दमट आर्द्रता युक्त वातावरणात साठवू नयेत.
भात	पुनर्लागवड	➤ घाट भागामध्ये ज्या भागामध्ये पुरेसा पाऊस झालेला आहे त्या भागात भात पुनर्लागवड सुरू करता येऊ शकते. ➤ हळव्या जातीची पुनर्लागवड पेरणीनंतर २१ ते २५ दिवसांनी, निमगरव्या जातीची २३ ते २६ व गरव्या जातीची २५ ते ३० दिवसांनी करावी. ➤ रोपांची पुनर्लागवड हळव्या वाणांमध्ये १५ x १५ सें.मी आणि निमगरव्या, गरव्या आणि संकरीत वाणांमध्ये २० x १५ सें.मी या अंतरावर करावी.
खरीप ज्वारी	पेरणी	➤ वाफसा असल्यास पेरणी पूर्ण करावी. लवकर पेरणी केल्यास खोडमशीचा उपद्रव कमी होतो. ➤ बीजप्रक्रिया : खरीप ज्वारीस १० किलो बियाण्यास २५० ग्रॅम अँझोटोबॅक्टर किंवा २५० ग्रॅम अँझोस्पीरिलम हे जिवाणू खत चोळावे. त्यामुळे १५ ते २० टक्के उत्पादन वाढते.



अॅग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

		- रासायनिक खते: ५० किलो नत्र, ५० किलो स्फुरद व ५० किलो पालाश प्रति हेक्टेरी पेरणीच्या वेळी द्यावे. - खरीप हंगामध्ये ज्वारी पिकाची पेरणीसाठी पुढील वाणांची उपलब्धता करून घ्यावी. - संकरित वाण: सी.एस.एच.-५, सी.एस.एच.-९, सी.एस.एच.-१३, सी.एस.एच.-१४, - सुधारित वाण ४६२-व्ही.पी.एस., सी १३-व्ही.एस., सी १५-व्ही.एस., पी ८४-व्ही.एस.एस : गोड ज्वारी .८०१-के.व्ही., सी-व्ही.एस. २४, फुले वसुंधरा. हे वाण वापरावे (संकरित)
मका	पेरणी	- शेतकरी बंधू ज्या ठिकाणी वाफसा आला आहे त्या ठिकाणी १५ जुलै पर्यंत पेरणी करू शकतात - बियाणे प्रमाण: धान्यासाठी - पेरणीकरिता एकरी ६ ते ८ किलो बियाणे तर चाऱ्यासाठी मका पेरणीकरिता एकरी ३० किलो बियाणे लागते. - बीजप्रक्रिया: पेरणीपूर्वी २ ते २.५ हे बुरशिनाशक प्रति किलो बियाण्यास चोळावे ग्रॅम थायरम ५.तसेच अँझोटोबॅक्टर जीवाणू संवर्धन २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास चोळून नंतर पेरणी करावी. - ज्या ठिकाणी उगवण झालेली नाही त्या ठिकाणी त्वरित नांग्या भराव्यात.
भुईमूग	पेरणी	- शेतकरी बंधू ज्या ठिकाणी वाफसा आला आहे त्या ठिकाणी १५ जुलै पर्यंत पेरणी करू शकतात - बीजप्रक्रिया - बियाण्यापासून प्रादुर्भाव होणाऱ्या व रोपावस्थेत येणाऱ्या रोगापासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २.५ ग्रॅम मॅन्कोझेब किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा जैविक बुरशिनाशक चोळावे. नंतर एक किलो बियाण्यास २५ ग्रॅम रायझोबीयम आणि २५ ग्रॅम स्फुरद विरघळणारे जीवाणू संवर्धक (घनरूप किंवा द्रवरूप) चोळावे बीजप्रक्रिया केलेले बियाणे सावलीत सुकवून पेरावे आंतरपिके - खरीप भुईमूग पिकात सोयाबीन, सुर्यफुल, मुग, उडीद व तूर हि आंतरपिके ६:२ या प्रमाणात घेतल्यास अधिक आर्थिक फायदा होतो. - पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी : भुईमूग+सोयाबीन (४:१) आणि कडेने एरंडीची लागवड (दोन ओळी)
ऊस	वाढीची	१५ जुलै नंतर आडसाली ऊस लागवड करण्यासाठी आवश्यक पूर्वमशागत रानबांधणी आखणी पूर्ण करून घ्यावी. - मध्यम जमिनीत एक मीटर अंतरावर तर भारी जमिनीत १.२० मीटर अंतरावर सरी उताराच्या आडवी सोडावी. - सरी सोडण्यापूर्वी प्रति हेक्टेरी ३० टन (६० बैलगाड्या) चांगले कुजलेले शेणखत अथवा कंपोस्ट वापरावे. - शेतकरी बंधू आडसाली ऊस लागवड १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या कालावधी दरम्यान करू शकतात. - आडसाली लागण करण्यासाठी को ८६०३२, फुले ०२६५ व फुले ऊस १५०१२ यापैकी कोणत्याही शिफारशीत वाणांची जमिनीच्या मगदूरानुसार उपलब्धता करून घ्यावी.
पशुधन	वाढीची	- गायी म्हशी नुकत्याच प्रसव झाल्या असल्यास नवजात वासरांची विशेष दक्षता घ्यावी. - नवजात वासरांना कोरड्या जागेवर, उबदार वातावरणात ठेवावे. वासरांना त्याच्या वजनाच्या १० टक्के इतका चीक दिवसातून ३ ते ४ वेळा विभागून तीन दिवस द्यावा. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल. - संपूर्ण पावसाळ्यात स्तनदाहाचे प्रमाण वाढते. त्यासाठी दुध काढण्यापूर्वी व काढल्यानंतर जीवाणूनाशक द्रावणाची कासेवर फवारणी करावी किंवा सडे द्रावणात बुडवावीत.
मेघदूत ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे 		दामिनी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे 

स्त्रोत

- १) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.
 २) मागील हवामान : भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशाळा विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर

ठिकाण : कोल्हापूर
 दि. : ०८.०७.२०२५

स्वाक्षरीत
 प्रमुख अन्वेषक, ग्राकूमैसे, ऐएमएफयु, कोल्हापूर तथा
 सहयोगी संशोधन संचालक,
 विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर