□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□. □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□,□□□□□□□□

□□□□□□□□ : □□□□□ □□□□□□ □□□□:

kvk_ndb@yahoo.com

□□) □□□□□□ : □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□. □□ □□□□□□□□, □□□□

□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□/□□/□□□□ □□ □□/□□/□□□□)				
□□□□□□	०६	०७	०८	०९	१०
□□□□(□□□□)	०	०	०	०	०
□□□□ □□□□□□(□□.□□.)	३१	३०	२९	२९	२९
□□□□□□□□□□□ (□□.□□.)	१६	१५	१६	१५	१४
□□ □□□□□□ (□□□□)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
□. □□□□□□□ □□□□□□□□ (%)	७८	७१	६६	६४	७०
□□.□□□□□□□ □□□□□□□□ (%)	४९	४४	४१	३९	४०
□□□□□ □□□ (□□□□/□□□)	१०	१०	९	९	९

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज सारांश		भारतीय हवामान विभाग, प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त हवामान अंदाजानुसार जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान २९ ते ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १४ ते १६ अंश सेल्सिअस पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्याचा विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज		दि. १० ते १६ डिसेंबर २०२५ दरम्यान मध्य महाराष्ट्रात कमाल व किमान तापमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
सामान्य सल्ला		हवामानाचा अंदाज व पीकनिहाय कृषीहवामान सल्ला पाहण्यासाठी **मेघदुत** मोबाईल ॲपचा वापर करावा.
संदेश		तण व्यवस्थापन आणि जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यासाठी आंतरमशागतीची कामे करून घ्यावीत.
हरभरा	**पेरणी**	हरभरा पिकाच्या चांगल्या वाढीसाठी शेत सुरुवातीपासूनच तण विरहीत ठेवावे. जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी पीक २० दिवसांचे झाल्यानंतर पहिली कोळपणी करावी.
रबी ज्वारी	**रोप वाढीची**	बागायती रब्बी ज्वारीस पेरणीनंतर ३० दिवसांनी राहीलेला ४० किलो नत्र प्रति हेक्टरी द्यावा. पहिले ३० ते ३५ दिवस कोळपण्या किंवा खुरपण्या देऊन तणमुक्त ठेवावे.
कापूस	**बोंड वाढीची ते वेचणी**	कापसाची वेचणी १५ ते २० दिवसांच्या अंतराने २ ते ३ वेळा करावी. वेचणी सकाळी करावी कारण हवेतील ओलाव्याने काडीकचरा, वाळलेली पाने कपाशीला चिकटत नाहीत. कापूस वेचताना चांगला प्रथम वेचावा नंतर पिवळसर रंग असलेला व किडका वेगळा वेचावा. वेचल्यानंतर ३-४ दिवस उन्हात वाळवून स्वच्छ व कोरड्या जागी साठवावा.
तुर	**शेंगा वाढीची**	शेंग माशी, घाटे अळी आणि पिसारी पतंग या किडींच्या नियंत्रणासाठी, इमामेक्टिन बेन्झोएट (५ एसजी) ०.३ मिलि प्रति लिटर पाणी किंवा इंडोक्झाकार्ब (१४.५ एससी) ०.३ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.
पपई	**फळ वाढीची**	हिवाळ्यात साधारणपणे दर १० दिवसानी गरजेनुसार पाणी द्यावे. पाणी देताना दुरेही आळे पद्धती, सरी किंवा ठिंबक सिंचन यांचा वापर करावा.
केळी	**फळ वाढीची**	हिवाळ्यात बागेत रात्रीच्या वेळी पाणी द्यावे. थंडीपासून संरक्षणासाठी केळीच्या घडास ६ % सच्छिद्रतेचे पांढ-या प्लास्टिक बॅगचे आवरण करावे.

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□. □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□,□□□□□□□□

□□□□□□□□ : □□□□□ □□□□□□ □□□□:

kvk_ndb@yahoo.com

आंबा	**वाढीची अवस्था**	थंडीमुळे फांदीमर या बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास रोगग्रस्त फांद्या प्रादुर्भावग्रस्त भागाच्या २ ते ३ इंच खाली कापून जाळून टाकाव्यात. कापलेल्या भागास बोर्डो पेस्ट किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ची पेस्ट लावावी. फांद्या आणि खोडावर कार्बेंडाझिम १ ग्रॅम किंवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ३ ग्रॅम प्रतिलिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी.
पशुसंवर्धन	-	थंडीची सुरुवात झाल्याने उर्जा व प्रथिनेयुक्त पशु आहाराचा समावेश करून पशुचा आहार वाढवावा. श्वसनाचे आजार संभावण्याची शक्यता असते त्यामुळे विशेषतः लहान वासरांची काळजी घ्यावी.

□□□□□□□□

□) □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ : □□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□.

□□□□□ : □□□□ □□□□□□□ □□□□□□,□□□□□□□□□

□□. : □□/□□/□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□,

□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ - □□□□□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□□,□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□,□□□□□□□□□