□□□□□□□□ : □□□□□ □□□□□□ □□□□:
kvk_ndb@yahoo.com

□□) □□□□□□□ : □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
□□. □□ □□□□□, □□□□

□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□/□□/□□□□ □□ □□/□□/□□□□)				
□□□□□□	११	१२	१३	१४	१५
□□□□(□□□□)	०	०	०	०	०
□□□□ □□□□□□(□□.□□.)	४०	३९	३८	३८	३९
□□□□□□□□□□□ (□□.□□.)	२०	२१	२१	२१	२१
□□ □□□□□□ (□□□□)	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ	स्वच्छ
□. □□□□□□□ □□□□□□□□ (%)	६९	६९	६९	७१	८०
□□.□□□□□□□ □□□□□□□□ (%)	१७	१६	१६	१८	२१
□□□□□ □□□ (□□□□/□□□)	६	३	६	५	८

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□

पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज सारांश		भारतीय हवामान विभाग, प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त हवामान अंदाजानुसार जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३८ ते ४० अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २० ते २१ अंश सेल्सिअस पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्याचा विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज		दि. १५ ते २१ मार्च २०२६ दरम्यान मध्य महाराष्ट्रात कमाल तापमान सरासरी एवढे व किमान तापमान सरासरी पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.
□□□	□□□□□□	□□□□ □□□□□ □□□□□
सामान्य सल्ला		पिकांवर फवारणी वारा शांत असताना करावी. सर्व पिके वेळेवर आंतरमशागत करून तणविरहीत ठेवावीत. पिकांवर किडीचा आणि रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ नये वेळेवर पीक संरक्षण करावे.
संदेश		रब्बी पिकांना पिकांच्या वाढीच्या संवेदनशील अवस्थेत पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.
हरभरा	**पक्वता ते काढणी**	जिरायती हरभरा परिपक्व झाला असल्यास काढणी व मळणी करून घ्यावी. हरभरा उन्हात६-७ दिवस वाळवून कोरड्या व हवेशीर जागी साठवणूक करावी. पीक ओलसर असताना काढणी करु नये.
गहू	**वाढीची ते पक्वता अवस्था**	उशिरा पेरलेले गहू पिकास पेरणीनंतर ८० ते ८५ दिवसांनी दाणे भरण्याच्या अवस्थेत चौथे पाणी द्यावे. वेळेवर पेरलेल्या गहू पिक पक्वता अवस्थेत असल्यास काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे.
रबी ज्वारी	**पक्वता अवस्था**	उशिरा पेरलेलेरबी ज्वारी पिक दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असल्यास पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. वेळेवर पेरलेले पिक पक्वता अवस्थेत असल्यास काढणी करून सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे.
भुईमुग	**उगवण**	भुईमुग पेरणीनंतर जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे ८ ते १० दिवसाचे अंतराने १० ते १२ वेळा पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.
कांदा	**पक्वता येण्याची अवस्था**	रांगडा कांदा काढणीच्या १० ते १५ दिवस अगोदर पाणी देणे बंद करावे. पिकाची काढणी ५० टक्के पातींच्या माना पडल्यानंतर करावी.
ऊस	**वाढीची अवस्था**	सुरु ऊस लागवडीनंतर जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे उन्हाळ्यात ८ ते १० दिवसाचे अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.
आंबा	**मोहोर फुटण्याची ते**	तापमानात वाढ होऊन आर्द्रतेत घट होण्याची शक्यता असल्याने, अशा वातावरणात

□□□□□□□□ : □□□□□ □□□□□□

□□□□:
kvk_ndb@yahoo.com

	फळ येण्याची अवस्था	फळधारणा झालेल्या आंबा बागेमधील वाटाणा ते सुपारी आकाराच्या फळांची गळ होण्याची शक्यता असते. ही फळगळ कमी करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार आठवड्याच्या अंतराने फळे सुपारीच्या आकाराच्या अवस्थेपर्यंत द्यावे.
पशुसंवर्धन	-	तापमान वाढत असल्याने उन्हापासून जनावरांचे संरक्षण करावे. हिरवा चारा देण्याची व्यवस्था करावी आणि पिण्यास थंड पाणी द्यावे.
कुक्कुटपालन	-	परसातील कुक्कुट पालनामध्येहे करावे: 1. आपल्या कुक्कुटपालनामधील पक्षांचा स्थलांतरीतपक्षांशी संपर्क टाळा. 2. पक्ष्यांच्या पाण्याची व खाद्याची भांडीदररोज स्वच्छ धुवा. 3. कुक्कुट पक्ष्यांच्या खुराड्यात स्वच्छता ठेवा. 4. पक्षांना नियमितपणे लसीकरणकरुन घ्या.

□□□□□□□□

□) □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ : □□□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□.

□□□□□ : □□□□ □□□□□□□ □□□□□□,□□□□□□□□□
□□. : □□/□□/□□□□

□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ – □□□□□□
□□□□ □□□□□□ □□□□□□,□□□□ □□□□□□□
□□□□□□,□□□□□□□□□