



राज्यीय कृषि विज्ञान प्रभुता परिषद

राज्यीय कृषि विज्ञान प्रभुता परिषद, राजस्थान शाखा, जयपुर
राज्यीय कृषि विज्ञान प्रभुता परिषद, राजस्थान शाखा, जयपुर
राजस्थान शाखा, जयपुर



राजस्थान शाखा : जयपुर

ईमेल:

kvk_ndb@yahoo.com

१) राजस्थान : राजस्थान शाखा, जयपुर शाखा, जयपुर
राजस्थान शाखा, जयपुर

राजस्थान शाखा	राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा (१०/१०/१००० १० १०/१०/१०००)				
राजस्थान	१४	१५	१६	१७	१८
राजस्थान (राजस्थान)	०	०	०	०	०
राजस्थान राजस्थान (१०.१०.)	३४	३४	३३	३१	३०
राजस्थान (१०.१०.)	१८	१८	१९	१७	१६
राजस्थान (राजस्थान)	स्वच्छ	स्वच्छ	अंशतः ढगाळ	स्वच्छ	स्वच्छ
राजस्थान राजस्थान (%)	६९	६५	६२	५९	६२
राजस्थान राजस्थान (%)	५४	५१	४८	४८	५०
राजस्थान (राजस्थान/राजस्थान)	२	३	४	३	५

राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा राजस्थान शाखा

पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज सारांश		भारतीय हवामान विभाग, प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त हवामान अंदाजानुसार जिल्ह्यात पुढील पाच दिवस हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३० ते ३४ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १६ ते १९ अंश सेल्सिअस पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे.
पुढील आठवड्याचा विस्तारित श्रेणी हवामान अंदाज		दि. १८ ते २४ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान मध्य महाराष्ट्रात कमाल तापमान सरासरी एवढे व किमान तापमान सरासरी पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे.
राजस्थान	राजस्थान	राजस्थान राजस्थान राजस्थान
सामान्य सल्ला		हवामानाचा अंदाज व पीकनिहाय कृषीहवामान सल्ला पाहण्यासाठी "मेघदुत" ॲपचा वापर करावा.
संदेश		रब्बी पिकांना पिकांच्या वाढीच्या संवेदनशील अवस्थेत पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.
गहू	शाखीय वाढीची	माव्याच्या नियंत्रणासाठी जैविक उपायांमध्ये व्हर्टीसीलीअम लेक्नी किंवा मेटारायझियम अॅनिसोप्ली ४ ग्रॅम प्रतिलिटर पाण्यातून फवारावे. आणि रासायनिक नियंत्रणासाठी थायमिथोक्झाम ०.१ ग्रॅम किंवा अॅसिटामिप्रिड ०.५ ग्रॅम प्रतिलिटर पाण्यातून फवारावे.
ज्वारी	वाढीची अवस्था	रबी ज्वारीमध्ये कमी तापमानामुळे मावा या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास सुरुवातीस निम अर्क ५% याची फवारणी करावी. प्रादुर्भाव जास्त झाल्यास डायमिथोएट ३० ईसी १.५ मिली किंवा थायमिथोक्झाम २५ WG ०.३ ग्रॅम प्रती लिटर पाण्यात घेऊन फवारणी करावी.
हरभरा	शाखीय वाढीची अवस्था	ढगाळ हवामानामुळे घाटेअळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असल्याने प्रादुर्भाव समजण्यासाठी हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पतंग अडकले जाऊन प्रजननास आळा बसतो. पिकात पक्ष्यांना बसण्यासाठी दर १५-२० मिटर अंतरावर पक्षी थांबे लावावेत. नियंत्रणासाठी ५ टक्के निंबोळी अर्क फवारणी करावी.
उन्हाळी भुईमुग	पेरणी	पेरणीची वेळ: पेरणी १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान करावी. बीजप्रक्रीया-बियाण्यापासून प्रादुर्भाव होणा-या व रोपावस्थेत येणा-या रोगापासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास ५ ग्रॅम थायरम किंवा २ ग्रॅम



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली : राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली :

kvk_ndb@yahoo.com

		कार्बन्डाइम किंवा ३ ग्रॅम मॅन्कोझेब किंवा ५ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा जैविक बुरशीनाशक चोळावे. नंतर एक किलो बियाण्यास २५ ग्रॅम रायझोबीयम आणि २५ ग्रॅम स्फुरद विरघळणारे जीवाणू संवर्धक चोळावे बीजप्रक्रीया केलेले बियाणे सावलीत सुकवून पेरावे.
ऊस	लागवड	सुरु ऊस लागवड १५ फेब्रुवारीपर्यंत करावी. बेणे प्रक्रिया : १०० लिटर पाण्यात ३०० मि.लि. मॅलॅथिऑन (५० इसी) आणि १०० ग्रॅम कार्बन्डाइम चांगले मिसळावे. त्यामध्ये टिपऱ्या १० मिनिटे बुडवाव्यात. त्यानंतर स्वतंत्रपणे १०० लिटर पाण्यात अॅसेटोबॅक्टर जीवाणू संवर्धक एकरी ४ किलो आणि स्फुरद विरघळविणारे जीवाणू संवर्धक ५०० ग्रॅम मिसळून या द्रावणात टिपऱ्या ३० मिनिटे बुडवाव्यात. त्यानंतर लगेच लागवड करावी.
टरबूज व खरबूज	लागवडीची तयारी	लागवडीचा हंगाम: या पिकाची लागवड प्रामुख्याने जानेवारी ते फेब्रुवारीमध्ये करावी. लागवडीसाठी खालील जातींची निवड करावी. कलिंगड जाती : शुगर बेबी, अर्का माणिक, अर्का ज्योती ई. खरबूज जाती : पुसा सरबती, दुर्गापुरा मधू, हरा मधू, अर्का राजहंस, अर्का ज्योत, ई.
पपई	फळ वाढीची	थंडीपासून संरक्षणासाठी फळास पांढ-या प्लास्टिक बॅगचे आवरण लावावे. फळबागेत सेंद्रिय आच्छादनाचा वापर केल्यास मुळांच्या कक्षेत उष्णता टिकून राहण्यास मदत होते. फळबागेत शक्यतो सकाळी पाणी द्यावे. ज्यामुळे जमिनीचे तापमान वाढून योग्य सूक्ष्म वातावरण निर्माण होऊन पिकावर होणारा थंडीचा परिणाम कमी होईल.
केळी	फळ वाढीची	थंडीपासून संरक्षणासाठी फळास पांढ-या प्लास्टिक बॅगचे आवरण लावावे. फळबागेत सेंद्रिय आच्छादनाचा वापर केल्यास मुळांच्या कक्षेत उष्णता टिकून राहण्यास मदत होते. फळबागेत शक्यतो सकाळी पाणी द्यावे. ज्यामुळे जमिनीचे तापमान वाढून योग्य सूक्ष्म वातावरण निर्माण होऊन पिकावर होणारा थंडीचा परिणाम कमी होईल.
पशुसंवर्धन	-	उर्जा व प्रथिनेयुक्त पशु आहाराचा समावेश करून पशुचा आहार वाढवावा. श्वसनाचे आजार संभावण्याची शक्यता असते त्यामुळे विशेषतः लहान वासरांची काळजी घ्यावी.
कुक्कुटपालन	-	परसातील कुक्कुट पालनामध्ये करावे: 1. आपल्या कुक्कुटपालनामधील पक्षांचा स्थलांतरीतपक्षांशी संपर्क टाळा. 2. पक्षांच्या पाण्याची व खाद्याची भांडीदररोज स्वच्छ धुवा. 3. कुक्कुट पक्षांच्या खुराड्यात स्वच्छता ठेवा. 4. पक्षांना नियमितपणे लसीकरणकरून घ्या.

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली

१) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली : राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली.

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली : राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली,
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली : ००/००/००००

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली,
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली -
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली,
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली