



अॅग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. ०३.०२.२०२३

जिल्हा : सांगली

मागील आठवड्यातील हवामान (२८.०१.२०२३ ते ०३.०२.२०२३)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (०४.०२.२०२३ ते ०८.०२.२०२३)				
२८	२९	३०	३१	०१	०२	०३	दिनांक	०४	०५	०६	०७	०८
-	-	-	-	-	-	-	पाऊस (मिमी)	०	०	०	०	०
-	-	-	-	-	-	-	कमाल तापमान (अं.से.)	३२.०	३३.०	३४.०	३५.०	३५.०
-	-	-	-	-	-	-	किमान तापमान (अं.से.)	१६.०	१६.०	१७.०	१७.०	१६.०
-	-	-	-	-	-	-	ढग स्थिती (आकाश)	२	०	१	२	२
-	-	-	-	-	-	-	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५८	५२	५६	५५	५५
-	-	-	-	-	-	-	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	३७	३३	३४	३२	३२
-	-	-	-	-	-	-	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१३.०	११.९	११.५	११.६	१०.२
-	-	-	-	-	-	-	वाऱ्याची दिशा	पु.ई.	पु.ई.	पु.ई.	पु.ई.	पु.ई.

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार सांगली जिल्ह्यामध्ये दिनांक ४ ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान आकाश मुख्यतः स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.० अंश सेल्सिअस दरम्यान तर किमान तापमान १६ ते १७ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सळची सापेक्ष आर्द्रता ५२ ते ५८% तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ३२ ते ३७% दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी १०.२ ते १३.० कि.मी. दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		- शेतकरी बंधूंनी कार्यक्षम जलसिंचन व्यवस्थापनासाठी पिकाच्या अवस्थेनुसार, जमिनीच्या प्रकाराप्रमाणे शेतामधील विविध पिकांच्या पाण्याची गरज व सिंचन संच चालू ठेवण्याचा कालावधी ई. महत्वपूर्ण माहिती आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवर मिळविण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर वरून " फुले इरिगेशन शेड्यूलर (PIS)" हे ॲप डाउनलोड करून वापरावे. - फळबागेतील तापमान नियंत्रित राहण्यासाठी फळबागांना शक्यतो रात्रीच्या वेळी पाणी द्यावे.
संदेश		फेब्रुवारी महिन्यामध्ये ऊस पिकास दररोज ३.२७ लिटर पाण्याची आवश्यकता असते त्यासाठी ठिबक सिंचन संच (४ लिटरचा ड्रीपर) दररोज ४९ मिनिटे चालवावा.
गहू	फुलोरा ते दाणे भरणे	- गहू पेरणीस ८० ते ८५ दिवस झाले असल्यास दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असताना पिकास पाणी द्यावे. - गहू पिकावरील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी थायोमिथोक्झाम २५ डब्लूजी ५० ग्रॅम प्रती हेक्टर ५०० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
रब्बी ज्वारी	दाणे भरणे ते पक्वता	- पक्व होत असलेल्या ज्वारी पिकाचे पक्षांपासून संरक्षण करावे. - ज्वारीच्या दाण्याच्या टोकाजवळ काळा ठिपक्याचे लक्षणे दिसताच ज्वारीची काढणी करावी व ८ ते १० दिवस कणसे उन्हात वाळवावीत.
हरभरा	फुलोरा ते घाटे भरणे	- हरभऱ्यावरील घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी पक्षी थांबे उभारावेत व हेक्टरी ५ या प्रमाणे कामगंध सापळे लावावेत. - हरभऱ्यावरील घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी हेलिओकिल ५०० मिली ५०० लिटर पाणी या प्रमाणात मिसळून प्रती हेक्टर फवारणी करावी.
ऊस	लागवड	सुरु ऊस लागवड १५ फेब्रुवारी पर्यंत पूर्ण केल्यास ऊस उत्पादकता व साखरेचा उतारा चांगला मिळतो. आडसाली ऊस लागवडीसाठी को. ८६०३२ (नीरा) किंवा को.एम.०२६५ (फुले २६५) या जातींची निवड करावी. एक डोळा रोपांपासून (३० ते ४५ दिवस वयाच्या रोपांची) ऊस लागवड करावी त्यामुळे नेहमीच्या तुलनेत ऊस लागणीस ३० ते ४५ दिवसांपर्यंत जोपासण्यासाठी लागणारे पाणी, तण नियंत्रण, खते,देखरेख यांची बचत होते. बेण्याद्वारे लागवड करावयाची असल्यास बेणे मळ्यात वाढवलेले ९ ते १० महिने वयाचे निरोगी, रसरशीत आणि अनुवांशिक दृष्ट्या शुद्ध ऊस बेणे वापरावे.
द्राक्ष	मणी वाढीची	हवेमध्ये जास्त आर्द्रता असल्याने व किमान तापमानात घट झाल्याने भुरी रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव झाल्यास नियंत्रणासाठी अमपेलोमायसेस क्विसक्वालीस @ ५ ग्रॅम प्रती लिटर पाणी याप्रमाणात फवारणी करावी.



अॅग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

		- बागेमध्ये तापमान नियंत्रित राहण्यासाठी द्राक्ष बागेस सायंकाळी पाणी द्यावे. - कमाल आणि किमान तापमानामध्ये जास्त फरक दिसून येत आहे त्यामुळे द्राक्ष मणी गुलाबी होण्याच्या समस्या निर्माण होत आहे. हि समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून द्राक्ष घड पेपरचा वापर करून झाकावेत.
हळद	पक्वता	हळद पिकाची काढणी जातीनुसार पिकाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर करावी. काढणीपुर्वी जमिनीच्या प्रतीनुसार १५ ते २० दिवस पाणी देणे बंद करावे.
बटाटा	वाढीची	बटाटा पिकावर काही ठिकाणी मावा किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आलेला आहे. प्रादुर्भाव दिसून येताच नियंत्रणासाठी थायमेटोक्झाम २५% डब्ल्यू. जी. २ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाणी याप्रमाणात मिसळून फवारणी करावी.
डालिंब	वाढीची	डालिंब फळपिकावर मावा, फुलकिडे, पांढरी माशी व फळे पोखरणारी आळी यांचा प्रादुर्भाव झाल्यास नियंत्रणासाठी सायनट्रिनीलप्रोल १०.२६% ओ.डी. ७ ते ९ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
पशुधन	वाढीची	- उन्हाळी हंगामासाठी ज्वारी, मका, चवळी, आणि संकरीत नेपियर गवत या चारा पिकांची लागवड करावी. - रात्री जनावरे गोठ्यात बांधावीत आणि त्यांना थंडीतून बचावासाठी कोरडी उबदार जागा उपलब्ध करून द्यावी

स्त्रोत

- १) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.
 २) मागील हवामान : भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशाळा विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर

ठिकाण : कोल्हापूर
 दि. : ०३.०२.२०२३

स्वाक्षरीत
प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, कोल्हापूर तथा
सहयोगी संशोधन संचालक,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर