



अग्रोमेट अडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयू, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. ०८.०७.२०२५

जिल्हा : सातारा

मागील आठवड्यातील हवामान (०२.०७.२०२५ ते ०८.०७.२०२५)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (०९.०७.२०२५ ते १३.०७.२०२५)				
०२	०३	०४	०५	०६	०७	०८	दिनांक	०९	१०	११	१२	१३
-	-	-	-	-	-	-	पाऊस (मिमी)	१८	१५	१०	९	१४
-	-	-	-	-	-	-	कमाल तापमान (अं.से.)	२७	२८	२८	३०	२९
-	-	-	-	-	-	-	किमान तापमान (अं.से.)	२२	२२	२२	२३	२३
-	-	-	-	-	-	-	ढग स्थिती (आकाश)	८	८	८	८	७
-	-	-	-	-	-	-	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८७	८६	८५	८५	८७
-	-	-	-	-	-	-	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७९	७५	७४	७५	७४
-	-	-	-	-	-	-	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१२	१२	१२	१३	१५
-	-	-	-	-	-	-	वाऱ्याची दिशा	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.	पू.नै.

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार सातारा जिल्ह्यामध्ये ९ ते १३ जुलै दरम्यान आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये घाट भागात दिनांक ९ व १० जुलै बऱ्याच ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या तसेच दिनांक ११, १२ व १३ जुलै रोजी काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे तसेच जिल्ह्याच्या मध्य व पूर्व भागात ९ व १० जुलै काही ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या तसेच दिनांक ११, १२ व १३ जुलै रोजी तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये पुढील ५ दिवसांत कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश सेल्सिअस या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पुढील ५ दिवसांत किमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ८५ ते ८७% या दरम्यान तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ७४ ते ७९% या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी १२ ते १५ किमी या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
विस्तारित श्रेणी अंदाज		विस्तारित श्रेणीच्या अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रामध्ये दिनांक ९ ते १५ जुलै, २०२५ दरम्यान पावसाचे प्रमाण सरासरी दरम्यान तसेच कमाल तापमान सरासरी दरम्यान तर किमान तापमान सरासरी दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
हवामान इशारा		➤ दिनांक ०८.०७.२०२५ रोजी सातारा जिल्ह्यामधील घाट भागात तुरळक ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. ➤ दिनांक ०९.०७.२०२५ रोजी सातारा जिल्ह्यामधील घाट भागात तुरळक ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. ➤ दिनांक १०.०७.२०२५ रोजी सातारा जिल्ह्यामधील घाट भागात तुरळक ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		❖ शेतकरी बांधवांनी हवामान आधारित शेतीविषयक सल्ला आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवर मिळविण्यासाठी गुगल प्ले स्टोर वरून "मेघदूत" अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन तर मेघवर्जना व विजांचा कडकडाट इ.च्या अंदाजासाठी "दामिनी" अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डाउनलोड करावे व त्याचा वापर करावा. ❖ मेघदूत ॲप डाउनलोड करण्यासाठी लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot ❖ दामिनी ॲप डाउनलोड करण्यासाठी लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini ➤ सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव ज्या ठिकाणी वाफसा आहे त्या ठिकाणी मका, भुईमूग आणि राजमा ई. पिकांची पेरणी करू शकतात
संदेश		गोठे स्वच्छ व कोरडे ठेवावेत. साठविलेल्या सुक्या चाऱ्यावर पाणी पडून त्यात बुरशी लागली असेल तर असा चारा जनावरांना देऊ नये तो बुरशी लागलेला चारा नष्ट करावा. जनावरांचे खाद्य / खाद्यघटक दमट आर्द्रता युक्त वातावरणात साठवू नयेत.
भात	पुनर्लागवड	➤ ज्या भागामध्ये पुरेसा पाऊस झालेला आहे त्या भागात भात पुनर्लागवड सुरु करता येऊ शकते. ➤ हळव्या जातींची पुनर्लागवड पेरणीनंतर २१ ते २५ दिवसांनी, निमगरव्या जातींची २३ ते २६ व गरव्या जातींची २५ ते ३० दिवसांनी करावी.



ऑग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

		रोपांची पुनर्लागवड हळव्या वाणांमध्ये १५ x १५ सें.मी आणि निमगरव्या ,गरव्या आणि संकरीत वाणांमध्ये २० x १५ सें.मी या अंतरावर करावी.
मका	पेरणी	- शेतकरी बंधू ज्या ठिकाणी वाफसा आला आहे त्या ठिकाणी १५ जुलै पर्यंत पेरणी करू शकतात बियाणे प्रमाण: धान्यासाठी – पेरणीकरिता एकरी ६ ते ८ किलो बियाणे तर चाऱ्यासाठी मका पेरणीकरिता एकरी ३० किलो बियाणे लागते. बीजप्रक्रिया: पेरणीपूर्वी २ ते २.५ ग्रॅम थायरम हे बुरशनाशक प्रती किलो बियाण्यास चोळावे ५.तसेच अँझोटोबॅक्टर जीवाणू संवर्धन २५ ग्रॅम प्रती किलो बियाण्यास चोळून नंतर पेरणी करावी. - ज्या ठिकाणी उगवण झालेली नाही त्या ठिकाणी त्वरित नांग्या भराव्यात.
भुईमूग	पेरणी	- शेतकरी बंधू ज्या ठिकाणी वाफसा आला आहे त्या ठिकाणी १५ जुलै पर्यंत पेरणी करू शकतात बीजप्रक्रिया - बियाण्यापासून प्रादुर्भाव होणाऱ्या व रोपावस्थेत येणाऱ्या रोगापासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २.५ ग्रॅम मॅन्कोझेव किंवा ४ ग्रॅम ट्रायकोडर्मा जैविक बुरशनाशक चोळावे. नंतर एक किलो बियाण्यास २५ ग्रॅम रायझोबीयम आणि २५ ग्रॅम स्फुरद विरघळणारे जीवाणू संवर्धक (घनरूप किंवा द्रवरूप) चोळावे बीजप्रक्रिया केलेले बियाणे सावलीत सुकवून पेरावे आंतरपिके - खरीप भुईमूग पिकात सोयाबीन, सुर्यफुल, मूग, उडीद व तूर हि आंतरपिके ६ : २ या प्रमाणात घेतल्यास अधिक आर्थिक फायदा होतो. - पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी : भुईमूग+सोयाबीन (४:१) आणि कडेने एरंडीची लागवड (दोन ओळी)
राजमा	पेरणी	- पुरेसा पाऊस झाला असल्यास जिल्ह्याच्या मध्य व पूर्व भागामध्ये शेतकरी बांधव (कराड, कोरेगाव, वाई, खंडाळा, खटाव) पेरणी करून शकतात - बीजप्रक्रिया: २५० ग्रॅम रायझोबीयम व २५० ग्रॅम पीएसबी जीवाणूसंवर्धन १० किलो बियाण्यास गुळाच्या थंड द्रावनातून बीजप्रक्रिया करावी - खते: राजमा पेरणी करताना ३० किलो नत्र आणि ८० किलो स्फुरद या प्रमाणे रसायनिक खताची मात्र द्यावी
बटाटा	लागवड	- कराड, कोरेगाव, वाई, खंडाळा, खटाव या तालुक्यांमध्ये बटाटा लागवड जुलै महिन्याच्या पहिल्या पंधरावड्या पर्यंत पूर्ण करावी लागवडीसाठी खालील वाणांची निवड करावी कुफरी, ज्योती, कुफरी लवकर, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज बीजप्रक्रिया: २.५ किलो अँझोटोबॅक्टर आणि ५०० मिली द्रवरूप अँसिटोबॅक्टर प्रती १०० लिटर पाण्यात २० क्विंटल बियाणे ३० मिनिटे बेणे प्रक्रिया करावी रसायनिक खते : लागवडीपूर्वी १००:६०:१२० किलो नत्र:स्फुरद: पालाश प्रति हेक्टर म्हणजेच लागवडीच्या वेळी युरिया खताच्या ०५ बॅगा, सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या ७.५ बॅग तसेच म्युरेट ऑफ पोटॅश या खताच्या ४ बॅग ही मात्रा प्रति हेक्टर द्यावी. लागवडीच्या वेळी २० किलो झिंक सल्फेट प्रति हेक्टर शेणखतात मिसळून द्यावे.
कुळीथ	पेरणी	- जिल्ह्याच्या मध्य व पूर्व भागामध्ये वाफसा असताना पेरणी पूर्ण करावी - पेरणीसाठी वाण: सीना, माण, फुले सकस - हेक्टरी बियाणे प्रमाणकिलो १५ ते १२ : - बीजप्रक्रिया किलो १० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी जीवाणूसंवर्धन २५० प्रत्येकी :बियाण्यास गुळाच्या थंड द्रावणातून चोळावे
मटकी	पेरणी	- जिल्ह्याच्या मध्य व पूर्व भागामध्ये वाफसा असताना पेरणी पूर्ण करावी - पेरणीसाठी वाण: एमबीएस २७, फुले सरिता - हेक्टरी बियाणे प्रमाणकिलो १५ ते १२ : - बीजप्रक्रिया: प्रत्येकी २५० ग्रॅम रायझोबीयम व पीएसबी जीवाणूसंवर्धन १० किलो बियाण्यास गुळाच्या थंड द्रावणातून चोळावे
डाळिंब	मृग बहार वाढीची	पिवळे/ निळे रंगाचे चिकट सापळे एकरी २४ या प्रमाणात वागेत नागमोडी पद्धतीने लावावेत. चिकट सापळे झाडाच्या उंचीच्या वरील भागापासून १५ सें.मी. खाली लावावेत/ लटकवावेत.
ऊस	वाढीची	१५ जुलै नंतर आडसाली ऊस लागवड करण्यासाठी आवश्यक पूर्वमशागत रानबांधणी आखणी पूर्ण करून घ्यावी. - मध्यम जमिनीत एक मीटर अंतरावर तर भारी जमिनीत १.२० मीटर अंतरावर सरी उताराच्या आडवी सोडावी. - सरी सोडण्यापूर्वी प्रति हेक्टरी ३० टन (६० बैलगाड्या) चांगले कुजलेले शेणखत अथवा कंपोस्ट वापरावे. - शेतकरी बंधू आडसाली ऊस लागवड १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या कालावधी दरम्यान करू शकतात. - आडसाली लागण करण्यासाठी को ८६०३२, फुले ०२६५ व फुले ऊस १५०१२ यापैकी कोणत्याही शिफारशीत वाणांची जमिनीच्या मगदूरानुसार उपलब्धता करून घ्यावी.
पशुधन	वाढीची	- गायी म्हशी नुकत्याच प्रसव झाल्या असल्यास नवजात वासरांची विशेष दक्षता घ्यावी. - नवजात वासरांना कोरड्या जागेवर, उबदार वातावरणात ठेवावे. वासरांना त्याच्या वजनाच्या १० टक्के इतका चिक दिवसातून ३ ते ४ वेळा विभागून तीन दिवस द्यावा. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल. - संपूर्ण पावसाळ्यात स्तनदाहाचे प्रमाण वाढते. त्यासाठी दुध काढण्यापूर्वी व काढल्यानंतर जीवाणूनाशक द्रावणाची कासेवर फवारणी



अॅग्रोमेट अॅडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

करावी किंवा सडे द्रावणात बुडवावीत.	
मेघदूत अॅप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे 	दाभिनी अॅप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे 

स्त्रोत

१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

ठिकाण : कोल्हापूर

दि. : ०८.०७.२०२५

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकमौसे, ऐएमएफयु, कोल्हापूर तथा
सहयोगी संशोधन संचालक,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, कोल्हापूर