



हवामान आधारित कृषि सल्ला
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जिल्हा कृषि हवामान केंद्र,
कृषि विज्ञान केंद्र, मोहोळ, सोलापूर.



दूरध्वनी - (०२१८९) २३३००१

ईमेल - damu.kvkmohol@gmail.com

(२८०) हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दिनांक ०३/०२/२०२३

मागील आठवड्यातील हवामान (दि २८.०१.२०२३ ते ०३.०२.२०२३)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज (दि.०४.०२.२०२३ ते ०८.०२.२०२३)				
२८	२९	३०	३१	०१	०२	०३	दिनांक	०४	०५	०६	०७	०८
०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	पाऊस (मि. मी.)	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
३३.८	३४.४	३३.६	३३.०	३२.६	३१.८	३१.४	कमाल तापमान (अं. से.)	३३.०	३४.०	३४.०	३४.०	३५.०
-	१८.३	१७.४	१९.६	२०.५	१७.४	१३.४	किमान तापमान (अं. से.)	१६.०	१६.०	१७.०	१८.०	१७.०
निरभ्र	निरभ्र	निरभ्र	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	निरभ्र	निरभ्र	ढग स्थिति (आकाश)	अंशतः ढगाळ	निरभ्र	निरभ्र	अंशतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ
-	६३	७३	७२	६९	७२	७१	सकाळची सापेक्ष आद्रता (%)	६२	६१	६३	६५	६६
२३	२०	२९	४१	४२	४१	-	दुपारची सापेक्ष आद्रता (%)	४२	३९	४०	३९	४०
१.९	५.६	३.७	०.०	३.७	०.०	४.७	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१२.३	११.२	१०.९	११.१	९.४

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		भारतीय हवामान खात्याच्या प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचे कडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार सोलापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०४, ०७, ०८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तर दिनांक ०५ फेब्रुवारी व ०६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. दिनांक ०४ फेब्रुवारी ते ०८ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस ते ३५ अंश सेल्सिअस पर्यंत तर किमान तापमान १६ ते १८ अंश सेल्सिअस पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. सकाळची सापेक्ष आद्रता ६१ ते ६६ % तर दुपारची सापेक्ष आद्रता ३९ ते ४२ % दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ९.४ किमी ते १२.३ किमी पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे.
विस्तारित श्रेणी अंदाज (ईआरएफएस)		विस्तारित अंदाजानुसार(ईआरएफएस)मध्य महाराष्ट्रात विभागात (सोलापूर,धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर) दिनांक ०९ फेब्रुवारी ते १४ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान कमाल तापमान सरासरी राहण्याची शक्यता आहे. किमान तापमान सरासरी राहण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		- शेतकरी बांधवांनी आपल्या पिकाचे कीड व रोगा संदर्भात नियमित सर्वेक्षण करून जर प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर असल्यास योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. - पिकावर कीटकनाशकाची,बुरशनाशकाची फवारणी करतांना योग्य ती खबरदारी व काळजी घ्यावी. - हवामान अंदाजावर आधारित कृषि सल्ला व हवामानाच्या पूर्वानुमानाकरिता मेघदूत या मोबाइलअॅपचा वापर करावा. विजेच्या अंदाजाच्या पूर्वानुमाना करिता दामिनी मोबाइलअॅपचा वापर करावा
संदेश		मेघदूत अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करावे. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
रब्बी ज्वारी	दाणे भरण्याची अवस्था	पक्व होत असलेल्या ज्वारी पिकांचे पक्षांपासून संरक्षण करावे. सर्वसाधारणपणे ९० ते १०० दिवस हा काळ कणसामध्ये दाणे भरण्याचा असतो. या अवस्थेत पाणी



हवामान आधारित कृषि सल्ला
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जिल्हा कृषि हवामान केंद्र,
कृषि विज्ञान केंद्र , मोहोळ , सोलापूर.



दूरध्वनी -(०२१८९) २३३००१

ईमेल-damu.kvkmohol@gmail.com

		मिळाल्याने कणसात दाणे भरण्यास मदत होते. कणसाचे वजन वाढून उत्पादन वाढते. ज्यांच्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असेल त्यांनी ज्वारीस पाणी द्यावे. हुरड्या साठी रब्बी ज्वारीच्या फुले मधुर वाणाचे दाणे मऊ व दुग्धावस्थेत असताना कणसाची काढणी करावी व हुरड्यासाठी विक्री करावी.
गहू	फुलोरा अवस्था	गहू पिकास फुलोरा अवस्थेत असताना आणि पेरणीस ६० ते ६५ दिवस झाले असल्यास गरजेनुसार पाणी द्यावे. पिक ५५ ते ७० दिवसाचे असताना १९:१९:१९ या विद्राव्य खताची २% (१० लिटर पाण्यात २०० ग्रॅम १९:१९:१९) या प्रमाणे दोन वेळा फवारणी करावी.
हरभरा	फुलोरा ते घाटे भरणे	हरभराला भरण्याच्या अवस्थेत पाणी मिळाल्याने घाट्या मधील दाणे भरण्यास मदत होते. व उत्पादन वाढते. ज्यांच्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असेल त्यांनी हरभरा पिकास पाणी द्यावे. हरभरा पिकास तुषार सिंचन पद्धतीने योग्य प्रमाणात पाणी द्यावे. प्रत्येक वेळी पाणी प्रमाणशिर (७ ते ८ सेमी) देणे महत्वाचे असते. जास्त पाणी दिले तर पिक उमळण्याचा धोका असतो. हरभऱ्यावरील घाटे अळीच्या नियंत्रणासाठी क्लोरॅन्ट्रीनीलीप्रोल १८.५% एस.सी. @ १०० मिली ५०० लिटर पाण्यातून प्रती हेक्टर याप्रमाणे फवारणी करावी. हरभऱ्यावरील घाटेअळीच्या नियंत्रणासाठी पक्षी थांबे उभारावेत व हेक्टरी ५ या प्रमाणे कामगंध सापळे लावावेत. जिरायती हरभरा परिपक्व झाला असल्यास काढणी व मळणी करून घ्यावी. हरभरा उन्हात वाळवून कोरड्या व हवेशीर जागी साठवणूक करावी.
करडई	दाणे भरण्याची अवस्था	करडई पिकावरील मावा किड आढळून आल्यास करडईवरील मावाच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी ७५ एस.पी. ऑसिफेट १६ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाणी या प्रमाणात पहिली फवारणी पेरणीनंतर ४० ते ४५ दिवसांनी आणि दुसरी फवारणी ५५ ते ६० दिवसांनी स्वच्छ वातावरणात करावी. करडई पिकात दुसरे पाणी पीक फुलोऱ्यात येताना ५५ ते ६० दिवसांनी द्यावे.
	खोडवा ऊस व्यवस्थापन	खोडवा ऊस व्यवस्थापन: उसाचे बुडखे मोठे राहिल्यास ते जमिनीलगत धारदार कोयत्याने छाटून घ्यावेत. त्यामुळे जमिनी खालील कोंब फुटण्यास वाव मिळतो व फूटव्यांची एकूण संख्या वाढते. बुडख्यांच्या छाटणी नंतर लगेचच ०.१ टक्के बाविस्टीन (१ ग्रॅम बाविस्टीन १ लिटर पाण्यात मिसळून तयार केलेल्या द्रावणाची) या बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. त्यामुळे मातीतून होणाऱ्या बुरशीजन्य रोगांचा प्रतिबंध होतो. सूक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापन: माती परीक्षणानुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता असल्यास एकरी १० किलो फेरस सल्फेट , ८ किलो झिंक सल्फेट, ४ किलो मॅंगनिज सल्फेट व २ किलो बोरॅक्सही सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खते १:१० सेंद्रिय खतामध्ये मिसळून ४ ते ५ दिवस सावलीत मुरवून वापरावीत.
ऊस	सुरु उस लागवड	सुरु उसाची लागवड १५ डिसेंबर ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान करावी. सुरु उस लागवड करण्यासाठी को.८६०३२(नीरा), को.एम.०२६५(फुले २६५), एम.एस.१०००१ (फुले १०००१), को.९४०१२(फुले सावित्री), को.सी.६७१(वसंत-१) या जातींची निवड करावी. सुरु उसामध्ये उन्हाळी भुईमूग, कांदा, काकडी, टरबूज, कलिंगड, इत्यादी पिके आंतरपीक म्हणून घेता येतात. बेणे प्रक्रिया: बुरशीजन्य रोग व खवले किड याच्यापासून प्रतिबंधासाठी ऊस बेणे लागणीपूर्वी १० लिटर पाण्यात डायमेटोएट ३०% प्रवाही २६ + मिली ५.१० ग्रॅम कार्बेन्डॅझिम मिसळून १० मिनिटांसाठी बेणे प्रक्रिया करावी. हुमनीचा प्रादुर्भाव असल्यास बीजप्रक्रियेसाठी इमिडक्लोप्रीड प्रती १० लिटर पाणी वापरून बेणे प्रक्रियाकरावी. ऑसेटोबॅक्टर आणि स्फुरद विरघळविणारे जीवाणू संवर्धक अनुक्रमे १०किलो आणि १ १००किलो प्रती २५. लिटरपाण्यात मिसळून तयार केलेल्या द्रावणात उसाच्या टिपऱ्या ३० मिनिटे बुडवून नंतर लागण करावी त्यामुळेनत्रखतामध्ये ५० % २५ची तर स्फुरद खतामध्ये %ची बचत होते. खताची मात्रा : सुरु उसाच्या लागणीच्या वेळी प्रति हेक्टरी २५ किलो नत्र (५५ किलो युरिया), ६० किलो

